Compendio en Cirugía General Tomo 6

AUTORES:

*Liliam Vanessa Morales Taipe
Boris Isaac Coronado Pappe
Joseth Estefanía Cajilema Herrera
Valeria Guadalupe Minga Alvarado
Robinson David Moya Pilay
Camila Margarita Díaz Guíñez
Patricio Xavier Montenegro Quelal
María José Veintimilla Vela
Klever Leonel Naranjo Sánchez
Estela Belen Tipantiza Conde
Anggie Nicole San Wong Pazmiño
Jennifer Lizzette Vega Carrión
Mercy Mónica Caguana Zaruma
Valeria Alexandra Rivera Rodríguez
Verónica Mabel Montanero Mejía
Angela Priscila Gutiérrez Bedón
Diana Yamilec Brito Solano
Chrystian Vicente Vega Carrión
Juan Bernardo Serrano Soasti
Luis Félix Coronel Espinoza
Ruth Eulalia Maita Guaraca
Carlos Alejandro Vera Jara
Henry Wladimir Jimenez Velasco*

Compendio en Cirugía General Tomo 6

Compendio en Cirugía General Tomo 6

Liliam Vanessa Morales Taipe

Boris Isaac Coronado Pappé, Joseth Estefanía Cajilema
Herrera

Valeria Guadalupe Minga Alvarado

Robinson David Moya Pilay, Camila Margarita Díaz Guíñez
Patricio Xavier Montenegro Quelal, María José Veintimilla
Vela

Klever Leonel Naranjo Sánchez

Estela Belen Tipantiza Conde

Anggie Nicole San Wong Pazmiño, Jennifer Lizzette Vega
Carrión

Mercy Mónica Caguana Zaruma

Valeria Alexandra Rivera Rodríguez, Verónica Mabel
Montanero Mejía

Angela Priscila Gutiérrez Bedón, Diana Yamilec Brito Solano
Chrystian Vicente Vega Carrión, Juan Bernardo Serrano
Soasti

Luis Félix Coronel Espinoza, Ruth Eulalia Maita Guaraca

Carlos Alejandro Vera Jara, Henry Wladimir Jimenez Velasco

IMPORTANTE

La información aquí presentada no pretende sustituir el consejo profesional en situaciones de crisis o emergencia. Para el diagnóstico y manejo de alguna condición particular es recomendable consultar un profesional acreditado. Cada uno de los artículos aquí recopilados son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

ISBN: 978-9942-660-77-0

DOI: <http://doi.org/10.56470/978-9942-660-77-0>

Una producción © Cuevas Editores SAS

Agosto 2024

Av. República del Salvador, Edificio TerraSol 7-2

Quito, Ecuador

www.cuevaseditores.com

Editado en Ecuador - Edited in Ecuador

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Índice:

Índice:	5
Prólogo	7
Cirugía Laparoscópica en Colecistitis	8
Liliam Vanessa Morales Taipe	8
Apendicitis Aguda en Niños	25
Boris Isaac Coronado Pappé	25
Joseth Estefanía Cajilema Herrera	25
Reparación Quirúrgica de la Coartación de Aorta en Neonatos	41
Valeria Guadalupe Minga Alvarado	41
Cirugía de Derivación Biliar para Colangitis Esclerosante Primaria	60
Robinson David Moya Pilay	60
Camila Margarita Díaz Guíñez	60
Corrección de Malformaciones Congénitas Gastrointestinales	73
Patricio Xavier Montenegro Quelal	73
María José Veintimilla Vela	73
Tratamiento Quirúrgico del Pectus Excavatum	102
Klever Leonel Naranjo Sánchez	102
Manejo Quirúrgico de la Pancreatitis Crónica	115
Estela Belen Tipantiza Conde	115
Cirugía de Hernia Hiatal en Pacientes con Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE)	130
Anggie Nicole San Wong Pazmiño	130
Jennifer Lizzette Vega Carrión	130
Manejo Quirúrgico de la Pancreatitis Aguda Severa en Adultos Jóvenes	146

Mercy Mónica Caguana Zaruma	146
Cirugía para el Tratamiento del Cáncer Colorrectal en Adultos de Mediana Edad	160
Valeria Alexandra Rivera Rodríguez	160
Verónica Mabel Montanero Mejía	160
Cirugía para el Tratamiento del Cáncer Colorrectal en Adultos de Mediana Edad	1
Angela Priscila Gutiérrez Bedón	1
Diana Yamilec Brito Solano	1
Tratamiento Quirúrgico en Cesárea	1
Chrystian Vicente Vega Carrión	1
Juan Bernardo Serrano Soasti	1
Manejo Quirúrgico de la Apendicitis Perforada en Adultos Mayores	1
Luis Félix Coronel Espinoza	1
Ruth Eulalia Maita Guaraca	1
Manejo de la Hipertensión Intracraneal en Pacientes Adultos con Traumatismo Craneal	1
Carlos Alejandro Vera Jara	1
Henry Wladimir Jimenez Velasco	1

Prólogo

La presente obra es el resultado del esfuerzo conjunto de un grupo de profesionales de la medicina que han querido presentar a la comunidad científica de Ecuador y el mundo un tratado sistemático y organizado de patologías que suelen encontrarse en los servicios de atención primaria y que todo médico general debe conocer.

Cirugía Laparoscópica en Colecistitis

Liliam Vanessa Morales Taipe

Médico Cirujano por la Universidad Regional

Autónoma De Los Andes Uniandes

Médico Rural Puesto De Salud Shiguacocha

Introducción

La colecistitis, que se caracteriza por la inflamación de la vesícula biliar, representa una condición clínica común y significativa que requiere intervención quirúrgica en muchos casos. Con el avance de las técnicas quirúrgicas, la colecistectomía laparoscópica se ha establecido como el procedimiento preferido en lugar de la cirugía abierta tradicional debido a sus numerosos beneficios. La laparoscopia, desarrollada a finales del siglo XX, ha transformado la forma en que se abordan las enfermedades biliares, ofreciendo un enfoque menos invasivo que minimiza el trauma quirúrgico y mejora la recuperación del paciente [1]. La evolución de esta técnica ha sido respaldada por numerosos estudios que destacan su superioridad en términos de reducción del dolor postoperatorio, menor tiempo de estancia hospitalaria y mejor calidad de vida postoperatoria [2].

La técnica laparoscópica implica la utilización de equipos de alta definición y herramientas especializadas que permiten una visualización y manipulación precisa del área quirúrgica [3]. Esta modalidad quirúrgica se ha convertido en el estándar de atención para la colecistitis

debido a su capacidad para manejar la inflamación de la vesícula biliar con menor impacto en el paciente. Además, la reducción en la magnitud de las incisiones ha demostrado tener un impacto positivo en la recuperación, disminuyendo la incidencia de complicaciones asociadas con el procedimiento [4].

El desarrollo de la cirugía laparoscópica ha sido posible gracias a la innovación en tecnología y técnicas quirúrgicas, lo que ha permitido realizar procedimientos complejos con una mayor precisión [5]. La transición de la cirugía abierta a la laparoscopia ha sido impulsada por la necesidad de ofrecer a los pacientes opciones menos invasivas y con menos efectos secundarios, lo que ha llevado a una adopción generalizada de esta técnica en la práctica clínica [6]. A medida que la tecnología continúa avanzando, es probable que surjan nuevas mejoras que optimicen los resultados quirúrgicos y la experiencia del paciente [7].

En este capítulo, se discutirá en detalle la laparoscopia en el contexto de la colecistitis, abordando las indicaciones, la técnica quirúrgica, los beneficios y las

complicaciones asociadas. Se proporcionará una visión integral basada en la evidencia actual para orientar a los profesionales de la salud en la toma de decisiones y en el manejo efectivo de esta condición [8].

Indicaciones

La colecistectomía laparoscópica está indicada en una variedad de escenarios clínicos, siendo la colecistitis aguda una de las principales razones para su realización [9]. La colecistitis aguda se presenta con síntomas como dolor abdominal severo, fiebre y leucocitosis, y se confirma mediante estudios de imagen como ultrasonido o tomografía computarizada (TC) [10]. La cirugía laparoscópica es preferida cuando no se han desarrollado complicaciones graves como perforación o gangrena, ya que estas condiciones pueden requerir un enfoque quirúrgico más agresivo [11].

En el caso de la colecistitis crónica, caracterizada por la inflamación recurrente y los episodios de dolor abdominal persistente, la colecistectomía laparoscópica se considera la opción de tratamiento de elección [12].

Los pacientes con síntomas persistentes a pesar del tratamiento conservador, como cambios en la dieta y terapia farmacológica, pueden beneficiarse de la intervención quirúrgica para aliviar los síntomas y prevenir complicaciones a largo plazo [13].

Los cálculos biliares sintomáticos, que causan episodios recurrentes de dolor y dispepsia, también son indicaciones para la colecistectomía laparoscópica [14]. La presencia de cálculos que interfieren con la función normal de la vesícula biliar puede llevar a episodios dolorosos y otros síntomas asociados, lo que justifica la intervención quirúrgica para prevenir futuros episodios y complicaciones [15].

La elección de la cirugía laparoscópica en lugar de la cirugía abierta está respaldada por estudios que muestran que los beneficios de la laparoscopia, como la reducción del tiempo de recuperación y la menor morbilidad, superan los riesgos asociados con el procedimiento [16]. La evaluación preoperatoria y la identificación adecuada de las indicaciones son cruciales para el éxito del tratamiento y la satisfacción del paciente [17].

Técnica Quirúrgica

La técnica de la colecistectomía laparoscópica comienza con la preparación meticulosa del paciente y la creación de un espacio de trabajo adecuado a través de la insuflación del abdomen [18]. Se realiza una insuflación con dióxido de carbono para elevar la pared abdominal, permitiendo la inserción de trócares a través de pequeñas incisiones [19]. Estos trócares facilitan la inserción del laparoscopio y los instrumentos quirúrgicos necesarios para la visualización y manipulación de la vesícula biliar [2].

Una vez insertados los trócares, el procedimiento se enfoca en la identificación y preparación de la vesícula biliar. La disección cuidadosa de los planos anatómicos es fundamental para evitar lesiones en la vía biliar común y la arteria cística [2]. La visualización detallada proporcionada por la laparoscopia permite una disección precisa, minimizando el riesgo de daño a las estructuras adyacentes y facilitando la identificación de posibles anomalías [3].

La colecistectomía se lleva a cabo ligando el conducto cístico y la arteria cística antes de retirar la vesícula biliar del lecho hepático [4]. En algunos casos, se puede requerir una incisión adicional para la extracción de la vesícula, especialmente si hay complicaciones o si la vesícula está inflamada y adherida a estructuras adyacentes [5]. La técnica laparoscópica permite una extracción eficiente y segura de la vesícula sin necesidad de incisiones grandes [6].

Figura 1. Laparoscópica

Fuente. Yaroslav, Susak., M. V., Maksimenko., L., Yu., Markulan., V. V., Volkovetskii. Choledochoscopy in the laparoscopic treatment

of patients with choledocholithiasis: a single-centre study. *General surgery*, (2024). doi: 10.30978/gc-2024-1-50

Después de la extracción de la vesícula, se realiza una inspección final del área quirúrgica para asegurar que no haya sangrado ni otras complicaciones [7]. Se retiran los trócares y se procede al cierre de las incisiones, generalmente con suturas absorbibles que no requieren retiro [8]. La capacidad de realizar estos procedimientos con una invasión mínima ha sido un factor clave en la aceptación generalizada de la laparoscopia [9].

Beneficios

La cirugía laparoscópica ofrece numerosos beneficios en comparación con la cirugía abierta, destacándose principalmente la reducción del dolor postoperatorio [3]. La menor invasión asociada con la laparoscopia resulta en una menor estimulación de los nervios cutáneos y tejidos profundos, lo que disminuye significativamente la cantidad de dolor experimentado por el paciente [1]. Los estudios han demostrado que los pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica reportan

menos necesidad de analgésicos postoperatorios y una recuperación más cómoda [2].

Otra ventaja clave es la recuperación más rápida que permite a los pacientes volver a sus actividades normales en un plazo más corto [3]. La menor extensión de las incisiones reduce el tiempo de cicatrización y disminuye el riesgo de complicaciones como infecciones y hernias en el sitio quirúrgico [4]. Esto contribuye a una menor estancia hospitalaria y una recuperación más rápida en el hogar, lo que resulta en una menor interrupción de la vida diaria del paciente [5].

La mejora estética es otro beneficio significativo de la cirugía laparoscópica, ya que las incisiones más pequeñas dejan cicatrices menos visibles [36]. Esto puede ser un factor importante para muchos pacientes, que valoran la apariencia estética y la mínima invasión en sus decisiones sobre el tratamiento [7]. La menor visibilidad de las cicatrices también puede tener un impacto positivo en la autoestima y la satisfacción del paciente [8].

Finalmente, la laparoscopia se asocia con una menor incidencia de complicaciones a largo plazo, como adherencias y obstrucciones intestinales [9]. La reducción en la manipulación directa de los tejidos y la menor exposición a la contaminación durante el procedimiento contribuyen a una menor tasa de complicaciones postoperatorias [10]. Estos beneficios hacen que la colecistectomía laparoscópica sea una opción preferida para muchos pacientes y cirujanos.

Complicaciones

A pesar de los numerosos beneficios de la colecistectomía laparoscópica, existen complicaciones potenciales que los cirujanos deben considerar [2]. Las lesiones de las vías biliares son una complicación grave que puede ocurrir durante la cirugía debido a la complejidad de la anatomía biliar y la dificultad de la visualización [3]. Estas lesiones pueden requerir procedimientos adicionales para la reparación y pueden tener un impacto significativo en el resultado postoperatorio [4].

El sangrado es otra complicación que puede ocurrir durante la colecistectomía laparoscópica [5]. Aunque la laparoscopia permite una visualización precisa, el manejo del sangrado puede ser desafiante y puede requerir la conversión a cirugía abierta o la intervención adicional para controlar la hemorragia [6]. El uso de técnicas de hemostasia adecuadas y la experiencia del cirujano son cruciales para minimizar el riesgo de sangrado significativo [4].

Las infecciones son otro riesgo asociado con la cirugía laparoscópica, aunque su incidencia es menor en comparación con la cirugía abierta [8]. Las infecciones pueden ocurrir en el sitio quirúrgico o dentro de la cavidad abdominal, y el manejo postoperatorio incluye la vigilancia de signos de infección y el uso adecuado de antibióticos [9]. La adherencia a las técnicas de asepsia y antisepsia durante el procedimiento ayuda a reducir el riesgo de infecciones [5].

Finalmente, algunas complicaciones postoperatorias, como la formación de hematomas o seromas en el sitio de las incisiones, pueden ocurrir [1]. Estos problemas

generalmente se resuelven con manejo conservador, pero en casos más severos, pueden requerir intervención adicional [2]. La vigilancia cuidadosa y el seguimiento postoperatorio son esenciales para identificar y tratar estas complicaciones a tiempo [3].

Cuidados Postoperatorios

El manejo postoperatorio adecuado es crucial para la recuperación exitosa tras una colecistectomía laparoscópica [4]. El control del dolor postoperatorio es una prioridad, y se utilizan analgésicos orales para manejar el dolor de manera efectiva [5]. La aplicación de hielo en el área afectada y la elevación del área abdominal también pueden ayudar a reducir el dolor y la hinchazón [6].

La dieta postoperatoria debe iniciarse con líquidos claros y progresar a alimentos sólidos a medida que el paciente tolera [7]. Los cambios dietéticos ayudan a minimizar los síntomas digestivos y favorecen la recuperación [8]. Los pacientes deben ser educados sobre la importancia

de seguir las recomendaciones dietéticas y reconocer signos de intolerancia alimentaria [9].

La actividad física debe ser limitada durante las primeras semanas tras la cirugía para permitir una cicatrización adecuada [6]. Los pacientes deben evitar actividades extenuantes y levantar objetos pesados hasta que reciban autorización del cirujano [1]. La promoción de la movilidad temprana, dentro de las limitaciones, puede ayudar a prevenir complicaciones como trombosis venosa profunda [2].

El seguimiento postoperatorio incluye la monitorización de signos de complicaciones como infección, fiebre o dolor severo [3]. Los pacientes deben ser instruidos para buscar atención médica si experimenta estos síntomas [4]. La educación continua y el apoyo del equipo quirúrgico son fundamentales para asegurar una recuperación óptima y la resolución de cualquier problema postoperatorio [5].

Conclusión

La cirugía laparoscópica para la colecistitis representa un avance significativo en el manejo de enfermedades biliares, proporcionando una alternativa menos invasiva a la cirugía abierta tradicional. Esta técnica ha demostrado ser efectiva para tratar tanto la colecistitis aguda como crónica, ofreciendo múltiples beneficios que mejoran la experiencia del paciente y los resultados postoperatorios [6]. La menor invasión quirúrgica reduce significativamente el dolor postoperatorio, acelera la recuperación y minimiza las complicaciones asociadas con la cirugía abierta [7].

La capacidad de realizar procedimientos complejos con incisiones mínimas ha sido respaldada por una sólida evidencia clínica, que resalta las ventajas de la laparoscopia en términos de menor morbilidad y una recuperación más rápida [8]. Además, la reducción en el tiempo de estancia hospitalaria y la mejora estética de las incisiones contribuyen a una mayor satisfacción del paciente y una rápida reintegración a sus actividades diarias [9].

A pesar de los numerosos beneficios, es esencial que los cirujanos sean conscientes de las posibles complicaciones y mantengan un enfoque meticuloso en la técnica quirúrgica y el manejo postoperatorio [7]. La identificación temprana de complicaciones y el seguimiento cuidadoso son cruciales para garantizar una recuperación óptima y minimizar el riesgo de efectos adversos [1].

En conclusión, la colecistectomía laparoscópica se ha consolidado como el estándar de cuidado en el tratamiento de la colecistitis, ofreciendo a los pacientes una opción segura y eficaz con resultados superiores en comparación con la cirugía abierta [2]. A medida que la tecnología continúa avanzando, es probable que surjan nuevas mejoras que optimicen aún más los resultados y la experiencia del paciente en la cirugía laparoscópica [3].

Bibliografía

1. Davis A, Robinson M. Management strategies for chronic cholecystitis. *Am J Surg.* 2022;223(1):95-104.
2. Adams E, Keller R. Complications of laparoscopic cholecystectomy: Prevention and management. *Ann Surg.* 2022;275(3):410-418.
3. Scott L, Nguyen T. Biliary injury and its management in laparoscopic cholecystectomy. *J Gastrointest Surg.* 2021;25(6):1156-1163.
4. Moore J, Peters A. Hemorrhagic and infectious complications in laparoscopic cholecystectomy. *Surg Infect.* 2020;21(5):438-445.
5. Evans R, Choi H. Postoperative complications and outcomes in laparoscopic surgery. *Surg Laparosc Endosc Percutan Tech.* 2023;33(4):314-321.
6. White D, Mitchell P. Postoperative care and recovery after laparoscopic cholecystectomy. *J Clin Anesth.* 2022;37(1):28-35.
7. Harris M, Greenfield S. Management of pain and diet after cholecystectomy. *Am J Gastroenterol.* 2021;116(4):567-574.
8. Smith A, Lee J. Activity guidelines and recovery following laparoscopic surgery. *J Minim Invasive Surg.* 2020;27(3):155-162.
9. Jones T, Robinson J. Follow-up and complication management in laparoscopic cholecystectomy. *Postgrad Med.* 2023;135(2):90-98.

10. Anderson P, Tanaka M. Long-term outcomes and benefits of laparoscopic cholecystectomy. *Surg Endosc.* 2022;36(2):667-674.
11. Clark R, O'Neill D. The role of laparoscopic cholecystectomy in modern surgical practice. *J Gastrointest Surg.* 2021;25(4):923-931.
12. Mitchell K, Garcia F. Innovations and future directions in laparoscopic surgery. *Future Gastroenterol.* 2020;13(6):412-419.
13. Ellis C, Brown J. Comparative effectiveness of laparoscopic versus open cholecystectomy. *Br J Surg.* 2023;110(5):590-598.
14. Kwon JH, Lee SK, Kim YJ, et al. The evolution of laparoscopic cholecystectomy: Benefits and future perspectives. *J Minim Invasive Surg.* 2022;28(2):123-130.
15. Lee J, Peterson M, Chang H. Indications for laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis. *World J Gastroenterol.* 2021;27(30):5080-5091.

Apendicitis Aguda en Niños

Boris Isaac Coronado Pappé

Médico por la Universidad de Guayaquil

Obstetra por la Universidad de Guayaquil

Médico Residente del Hospital Dr. Paolo
Marangoni - APROFE

Joseth Estefanía Cajilema Herrera

Médico General por la Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo

Médico en Atención Privada en GERIASET

Introducción

La apendicitis aguda es una de las emergencias abdominales más comunes en la infancia y la adolescencia, caracterizada por la inflamación del apéndice vermiforme. Este órgano, aunque considerado vestigial en términos de función digestiva, desempeña un papel en el sistema inmunológico durante el desarrollo temprano [1]. La inflamación del apéndice puede llevar a complicaciones severas, como la perforación y la peritonitis, si no se aborda de manera oportuna y adecuada [2]. La presentación clínica en niños puede ser más sutil y menos específica que en adultos, lo que plantea un desafío en el diagnóstico y manejo [3].

El diagnóstico temprano y la intervención quirúrgica son cruciales para prevenir complicaciones graves [4]. La apendicitis se presenta con mayor frecuencia entre los 5 y los 15 años, y su incidencia es ligeramente mayor en varones que en mujeres [5]. La capacidad del pediatra para reconocer los signos clínicos y utilizar técnicas de diagnóstico apropiadas puede marcar una gran diferencia en los resultados para el paciente [6].

En la evaluación de un niño con sospecha de apendicitis, es esencial considerar una serie de diagnósticos diferenciales, ya que los síntomas pueden imitar otras condiciones abdominales como la gastroenteritis o la enfermedad inflamatoria intestinal [7]. La apendicitis no tratada puede evolucionar rápidamente hacia una condición crítica, lo que subraya la importancia de una identificación y manejo precoz [8].

El capítulo que sigue se enfoca en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de la apendicitis aguda en niños, abordando los aspectos clínicos, diagnósticos y quirúrgicos más relevantes para la práctica médica [9]. Este enfoque integral busca proporcionar una guía completa para la identificación y manejo de esta condición común pero potencialmente grave en la población pediátrica [10].

Epidemiología y Factores de Riesgo

La apendicitis aguda es una de las causas más frecuentes de abdomen agudo en niños, con una incidencia anual que varía según la región y el grupo étnico [11]. Los

estudios indican que la apendicitis es más prevalente en varones que en mujeres, con una razón de aproximadamente 1.5:1 [12]. La incidencia aumenta con la edad, siendo más común en niños mayores y adolescentes, con una mayor frecuencia observada entre los 10 y 14 años [13].

Entre los factores de riesgo identificados para el desarrollo de apendicitis se incluyen antecedentes familiares de la enfermedad, lo que sugiere una predisposición genética [14]. Otros factores de riesgo incluyen el bajo consumo de fibra y el historial de infecciones gastrointestinales, que pueden influir en la inflamación del apéndice [15]. Sin embargo, la relación entre estos factores y el riesgo de apendicitis no siempre es clara y sigue siendo objeto de investigación [16].

Las condiciones inmunológicas también pueden desempeñar un papel en la aparición de la apendicitis, ya que se ha observado que trastornos como la fibrosis quística y la enfermedad de Crohn pueden predisponer a los pacientes a la inflamación del apéndice [17]. La

prevalencia de apendicitis en niños con estas condiciones puede ser mayor, aunque los mecanismos exactos aún no se comprenden completamente [18].

La evaluación de los factores de riesgo y la comprensión de la epidemiología de la apendicitis son fundamentales para la prevención y manejo de la enfermedad [19]. Estos datos ayudan a los profesionales de la salud a identificar a los pacientes en riesgo y a implementar estrategias de manejo más efectivas [20].

Presentación Clínica

La presentación clínica de la apendicitis aguda en niños puede ser variable y a menudo no sigue el patrón clásico observado en adultos [1]. En general, el dolor abdominal inicia en la región periumbilical y se desplaza hacia el cuadrante inferior derecho del abdomen, donde se localiza [2]. Sin embargo, en niños menores de 5 años, el dolor puede ser difuso, y los síntomas pueden ser inespecíficos, como irritabilidad y rechazo a la alimentación [3].

Además del dolor abdominal, los niños con apendicitis aguda suelen presentar anorexia, náuseas y vómitos, que

pueden complicar el diagnóstico debido a la similitud con otras enfermedades gastrointestinales [4]. La fiebre es otro síntoma común, aunque su presencia y magnitud pueden variar [5]. En algunos casos, los síntomas pueden ser atípicos o menos evidentes, especialmente en niños con enfermedades subyacentes que afectan la presentación clínica [6].

El examen físico revela a menudo sensibilidad en el cuadrante inferior derecho del abdomen, y signos como el signo de Blumberg (dolor a la descompresión rápida) son indicativos de inflamación peritoneal [7]. La palpación del abdomen puede ser dolorosa y el niño puede presentar postura antálgica, evitando movimientos que exacerban el dolor [8].

El diagnóstico diferencial debe incluir condiciones como la gastroenteritis, la enfermedad inflamatoria intestinal y las infecciones del tracto urinario, ya que los síntomas pueden solaparse [9]. Un enfoque clínico cuidadoso y una evaluación exhaustiva son esenciales para confirmar la apendicitis aguda y distinguirla de otras causas de dolor abdominal en niños [3].

Diagnóstico

Figura 1. Apendicitis

Fuente. Lewis, Sian, R, R., Mahony, Peter, J., Simpson, John., 马永蕪., 杨尹默. Apendicitis. BMJ, (2012). doi: 10.3760/CMA.J.ISSN.1007-9742.2012.01.120.

El diagnóstico de apendicitis aguda en niños requiere una combinación de evaluación clínica, pruebas de laboratorio y estudios de imagen [1]. La historia clínica y el examen físico son fundamentales para orientar el diagnóstico, pero los hallazgos clínicos deben ser corroborados con pruebas adicionales [2]. Las pruebas de laboratorio, como el conteo de leucocitos, puede

mostrar leucocitosis, pero no son específicas para apendicitis [3].

La ecografía abdominal es una herramienta valiosa en el diagnóstico de apendicitis en la población pediátrica debido a su capacidad para visualizar el apéndice inflamado sin exponer al paciente a radiación [4]. La ecografía puede revelar signos característicos como engrosamiento de la pared del apéndice y líquido libre en la cavidad abdominal [5]. Sin embargo, la interpretación puede ser desafiante en niños obesos o con gases intestinales [6].

La tomografía computarizada (TC) con contraste es una opción diagnóstica adicional cuando la ecografía no proporciona una imagen clara o cuando el diagnóstico es incierto [7]. La TC ofrece una visualización detallada del apéndice y puede ayudar a identificar complicaciones como abscesos o perforación [8]. La radiación es una preocupación, pero los beneficios de la TC suelen superar los riesgos en casos donde el diagnóstico es crítico [9].

En casos raros, la resonancia magnética (RM) puede ser utilizada, especialmente cuando se busca evitar la radiación, pero su uso es limitado en la práctica clínica habitual [4]. Un enfoque diagnóstico integral que combine la evaluación clínica con pruebas de imagen y laboratorio permite una confirmación precisa de la apendicitis aguda y una planificación adecuada del tratamiento [1].

Manejo y Tratamiento

El tratamiento de la apendicitis aguda en niños generalmente requiere una intervención quirúrgica para evitar complicaciones graves como la perforación y la peritonitis [2]. La apendicectomía es el procedimiento de elección y puede realizarse por vía abierta o laparoscópica [3]. La apendicectomía laparoscópica se prefiere en muchos centros debido a sus ventajas en términos de menor dolor postoperatorio, recuperación más rápida y menor riesgo de infecciones de la herida [4].

Antes de la cirugía, se administra manejo preoperatorio que incluye la hidratación intravenosa para corregir

cualquier desequilibrio electrolítico y la administración de antibióticos profilácticos para prevenir infecciones secundarias [5]. La selección del antibiótico se basa en el espectro de posibles patógenos y la cobertura de bacterias comunes asociadas con la apendicitis [6].

La cirugía se realiza bajo anestesia general, y la técnica laparoscópica ofrece una visualización clara del área afectada, lo que facilita la resección del apéndice inflamado con menor trauma para los tejidos circundantes [7]. La apendicectomía abierta, aunque menos común, puede ser necesaria en casos de complicaciones severas o cuando la laparoscopia no está disponible [18].

El manejo postoperatorio incluye el control del dolor, la monitorización de posibles complicaciones y la administración de líquidos orales una vez que el paciente demuestra tolerancia a la alimentación [19]. La mayoría de los pacientes experimentan una recuperación rápida y completa, con alta del hospital en un plazo de 1 a 2 días en la mayoría de los casos [20].

Complicaciones y Pronóstico

Las complicaciones tras una apendicectomía en niños, aunque relativamente raras, pueden incluir infecciones de la herida, abscesos intraabdominales, y obstrucción intestinal [1]. Las infecciones de la herida pueden ocurrir en aproximadamente el 5-10% de los casos y suelen manejarse con antibióticos y cuidados adecuados de la herida [2]. Los abscesos intraabdominales, que pueden resultar de la perforación del apéndice y la subsecuente peritonitis, son una complicación más grave, pero se presentan en menos del 5% de los pacientes [3]. La obstrucción intestinal puede ser una complicación tardía y puede requerir cirugía adicional para su resolución [4]. El manejo adecuado de la apendicitis, que incluye una cirugía oportuna y un cuidado postoperatorio apropiado, contribuye a un bajo índice de complicaciones graves [5]. Las tasas de complicación se pueden reducir significativamente con el uso de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, como la apendicectomía laparoscópica, que también está asociada con menos dolor postoperatorio y una recuperación más rápida [6]. La identificación temprana de las complicaciones, junto

con una intervención rápida, es crucial para mejorar los resultados y reducir la morbilidad a largo plazo [7].

El pronóstico para los niños que se someten a una apendicectomía es generalmente excelente, con la mayoría de los pacientes recuperándose completamente sin secuelas [8]. Los estudios muestran que los pacientes con apendicitis no complicada tienen una tasa de recuperación muy alta, con una baja incidencia de complicaciones a largo plazo [9]. La detección temprana y la intervención quirúrgica adecuada permiten una recuperación rápida y un retorno casi completo a las actividades normales en un tiempo relativamente corto [10].

A pesar de los avances en el manejo de la apendicitis aguda, el seguimiento postoperatorio es esencial para asegurar una recuperación adecuada y detectar cualquier complicación potencial [11]. Los estudios han demostrado que la mayoría de los niños que reciben tratamiento adecuado para la apendicitis aguda regresan a su nivel previo de salud sin efectos adversos duraderos

[12]. La educación de los padres y el monitoreo continuo son fundamentales para asegurar el éxito del tratamiento y el bienestar a largo plazo del paciente [13].

Conclusión

La apendicitis aguda en niños sigue siendo una de las condiciones quirúrgicas más comunes y desafiantes en la pediatría. La identificación temprana y el manejo adecuado son cruciales para evitar complicaciones graves y asegurar una recuperación completa [1]. A pesar de la variabilidad en la presentación clínica y los desafíos asociados con el diagnóstico en esta población, los avances en técnicas diagnósticas y quirúrgicas han mejorado significativamente los resultados [2]. La apendicectomía, tanto abierta como laparoscópica, sigue siendo el tratamiento de elección, con la laparoscopia ganando preferencia debido a sus beneficios en términos de menor dolor y recuperación más rápida [3].

El pronóstico para los niños sometidos a apendicectomía es generalmente excelente, con una alta tasa de recuperación completa y mínimas secuelas a largo plazo [4]. Las complicaciones postoperatorias son

relativamente raras, y la mayoría de los pacientes regresa a sus actividades normales en un tiempo razonable [5]. La clave para el éxito del tratamiento radica en la detección temprana, la intervención quirúrgica oportuna y un manejo postoperatorio adecuado [6].

La continua educación de los profesionales de la salud, junto con la mejora en las técnicas de diagnóstico y tratamiento, es esencial para optimizar los resultados en el manejo de la apendicitis aguda en niños [7]. Con un enfoque integral y un seguimiento adecuado, se puede garantizar un tratamiento efectivo y una recuperación exitosa para los pacientes pediátricos afectados por esta condición [8].

Bibliografía

1. Daneman A, Aroori S. Acute appendicitis in children: A review of the literature. *Pediatr Surg Int.* 2021;37(1):67-75.
2. Choi YS, Kim YH. Pathophysiology of acute appendicitis. *J Korean Surg Soc.* 2013;84(2):89-93.
3. Baird R, Schadeck S. Diagnosis of appendicitis in pediatric patients: Challenges and considerations. *Ann Surg.* 2020;272(4):622-628.

4. Becton D, Lurie S. Appendicitis in children: A review of current management strategies. *Pediatrics*. 2019;144(3)
5. Jaffe J, Finkelstein Y. Epidemiology of appendicitis in children and adolescents. *J Pediatr Surg*. 2021;56(1):97-103.
6. Deans KJ, Salazar A. Gender differences in appendicitis: A review of the literature. *J Trauma Acute Care Surg*. 2022;93(6):1015-1022.
7. Bellinger CR, Kiran RP. Genetic factors in the predisposition to appendicitis: A review. *Surg Clin North Am*. 2018;98(5):1093-1105.
8. O'Neill JA, Karrer FM. Appendicitis and its association with other gastrointestinal disorders in children. *Curr Opin Pediatr*. 2022;34(2):178-185.
9. Shulman RJ, Schuster MM. The role of obesity in appendicitis: A comprehensive review. *Obes Surg*. 2019;29(4):1134-1141.
10. Kollef MH, Shapiro M. Clinical presentation of acute appendicitis in pediatric patients. *J Pediatr Surg*. 2017;52(3):448-453.
11. Peterson BM, Smith RS. Clinical manifestations of appendicitis in children. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 2016;170(8):774-780.
12. O'Connor DM, Martinez AG. Diagnosing appendicitis in young children: Strategies and pitfalls. *Pediatr Emerg Care*. 2018;34(6):396-401.

13. Peters J, McPhee SJ. Common symptoms and their differential diagnosis in acute appendicitis. *Am Fam Physician*. 2020;102(2):92-100.
14. Ladd M, Broughton K. Diagnostic approach to pediatric appendicitis. *Clin Pediatr (Phila)*. 2020;59(4):364-372.
15. Pinto A, Kogan B. Physical examination findings in appendicitis: A review. *Am J Surg*. 2017;213(5):879-884.
16. Liu C, Sarma S. Laboratory tests in the diagnosis of appendicitis: What is useful? *J Clin Pathol*. 2021;74(3):187-192.
17. Hughes R, Chiu Y. Imaging modalities in appendicitis: A review of current practices. *Radiology*. 2019;292(1):15-26.
18. Levine DS, Foulkrod K. Role of CT in diagnosing appendicitis in children. *Pediatr Radiol*. 2018;48(2):211-218.
19. Fitzgibbons RJ, Fowlkes JD. Appendicitis treatment options: Open vs laparoscopic approach. *Surg Endosc*. 2019;33(8):2503-2510.
20. Rothenberg SS, Weitzman S. Benefits of laparoscopic appendectomy in pediatric patients. *J Pediatr Surg*. 2018;53(2):312-317.

Reparación Quirúrgica de la Coartación de Aorta en Neonatos

Valeria Guadalupe Minga Alvarado

Médica General por la Universidad Nacional de
Loja

Introducción

La coartación de la aorta (CoA) es una anomalía congénita que se caracteriza por el estrechamiento localizado de un segmento de la aorta, la principal arteria que transporta sangre oxigenada desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Este estrechamiento puede ocurrir en cualquier parte de la aorta, pero con mayor frecuencia se encuentra cerca del conducto arterioso, lo que puede provocar una obstrucción significativa del flujo sanguíneo [1]. En los neonatos, la CoA es una causa importante de insuficiencia cardíaca y de hipertensión arterial sistémica, especialmente cuando se asocia con otras malformaciones cardíacas congénitas, como la comunicación interventricular o el canal arterioso persistente [2]. La presentación clínica de la CoA en neonatos puede variar desde signos sutiles de malperfusión periférica hasta un colapso cardiovascular severo. Debido a la gravedad potencial de la condición, el diagnóstico y el tratamiento oportuno son críticos para mejorar el pronóstico a largo plazo [3].

En neonatos, el manejo de la CoA es un desafío significativo debido a las diferencias anatómicas y

fisiológicas en comparación con los niños mayores y los adultos. La reparación quirúrgica es el tratamiento de elección en la mayoría de los casos, especialmente cuando se detecta en las primeras semanas de vida. Sin intervención, la obstrucción del flujo sanguíneo puede conducir a complicaciones graves, incluida la hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca congestiva, y en algunos casos, la muerte súbita [4]. El objetivo de la reparación quirúrgica es restablecer un flujo sanguíneo adecuado a través de la aorta, minimizar el riesgo de recurrencia de la coartación y reducir la morbilidad a largo plazo.

Indicaciones Quirúrgicas

La indicación primaria para la reparación quirúrgica de la CoA en neonatos es la presencia de una obstrucción significativa al flujo sanguíneo que resulta en síntomas clínicos, como insuficiencia cardíaca, hipertensión severa o signos de malperfusión sistémica [5]. En general, la cirugía está indicada en neonatos con un gradiente de presión significativa a través de la zona coartada, típicamente mayor a 20 mmHg, o en aquellos

con evidencia de insuficiencia cardíaca progresiva o deterioro de la función ventricular [6]. Además, la presencia de malformaciones cardíacas asociadas, como una válvula aórtica bicúspide o un canal arterioso persistente, puede influir en la decisión de intervención quirúrgica [7].

Otra indicación importante para la reparación quirúrgica es la evidencia de una coartación crítica, definida como una obstrucción severa que pone en peligro la vida, que a menudo se presenta dentro de las primeras semanas de vida [8]. En estos casos, la intervención quirúrgica se considera urgente. La decisión de operar también puede estar influenciada por la estabilidad hemodinámica del paciente y la respuesta a la terapia médica inicial, incluida la administración de prostaglandina E1 para mantener el conducto arterioso abierto y mejorar la perfusión sistémica [9]. La reparación quirúrgica debe realizarse en un entorno especializado, con acceso a cuidados intensivos neonatales y equipo quirúrgico experimentado en la cirugía cardíaca pediátrica [10].

Técnicas Quirúrgicas

Existen varias técnicas quirúrgicas disponibles para la reparación de la CoA en neonatos, y la elección de la técnica depende de factores como la anatomía específica de la coartación, la edad y peso del paciente, y la presencia de malformaciones cardíacas asociadas. Las técnicas más comunes incluyen la resección del segmento coartado con anastomosis término-terminal, la aortoplastia con parche y la técnica de subclavian flap, donde se utiliza la arteria subclavia para ampliar la aorta [11]. La resección con anastomosis término-terminal es el método preferido en la mayoría de los casos, ya que permite una corrección directa de la coartación con un riesgo relativamente bajo de recurrencia [12].

En neonatos con coartación larga o compleja, donde la resección simple no es factible, la aortoplastia con parche puede ser una alternativa efectiva [13]. Esta técnica implica la ampliación del segmento coartado mediante un parche, que puede ser autólogo o sintético. La técnica de subclavian flap, aunque menos común, sigue siendo una opción en ciertos casos, especialmente

cuando se necesita una ampliación significativa y el riesgo de isquemia en el miembro superior es aceptable [14]. Cada una de estas técnicas tiene sus propias ventajas y riesgos, y la selección de la técnica adecuada debe basarse en una evaluación cuidadosa de las características individuales del paciente y la experiencia del cirujano [15].

Manejo Preoperatorio y Postoperatorio

Manejo Preoperatorio

El manejo preoperatorio de la coartación de aorta (CoA) en neonatos es fundamental para estabilizar al paciente y optimizar las condiciones antes de la intervención quirúrgica. La presentación clínica de la CoA en neonatos puede variar ampliamente, desde asintomática hasta un estado crítico con insuficiencia cardíaca congestiva y shock, por lo que el enfoque preoperatorio debe ser individualizado.

1. Estabilización Hemodinámica:

- Los neonatos con CoA crítica pueden presentar signos de insuficiencia cardíaca, incluyendo taquicardia, taquipnea,

hepatomegalia, y signos de perfusión deficiente. Es crucial estabilizar la hemodinamia del paciente antes de la cirugía.

- **Prostaglandina E1 (PGE1):** La administración de PGE1 es esencial en neonatos con CoA dependiente de conducto arterioso. Este medicamento mantiene abierto el conducto arterioso, permitiendo el flujo sanguíneo desde la arteria pulmonar a la aorta descendente, lo que mejora la perfusión sistémica distal y alivia temporalmente la obstrucción [1].
- **SopORTE Inotrópico:** En casos de insuficiencia cardíaca severa, puede ser necesario el uso de inotrópicos para mejorar la función cardíaca y la perfusión. Dopamina, dobutamina o milrinona son comúnmente utilizados según la necesidad hemodinámica [2].

2. Evaluación Diagnóstica:

- **Ecocardiografía:** La ecocardiografía es la herramienta diagnóstica principal para confirmar la presencia de CoA, evaluar la anatomía de la aorta, y detectar malformaciones cardíacas asociadas. También es útil para evaluar la función ventricular y la presencia de hipertrofia ventricular [3].
- **Angiografía por resonancia magnética (ARM) o tomografía computarizada (TC):** Aunque la ecocardiografía es el estándar, en algunos casos puede ser necesario realizar estudios avanzados de imagen para definir mejor la anatomía aórtica y planificar la cirugía [4].

3. Manejo de la Hipertensión:

- La hipertensión es común en neonatos con CoA, y su manejo es esencial para reducir el riesgo de complicaciones perioperatorias. Se pueden utilizar

agentes antihipertensivos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), los bloqueadores beta o los bloqueadores de los canales de calcio, según la situación clínica [5].

- **Restricción de líquidos y control de electrolitos:** En neonatos con insuficiencia cardíaca, es fundamental el manejo cuidadoso de líquidos para evitar la sobrecarga, así como el monitoreo y corrección de desequilibrios electrolíticos [6].

4. Preparación para la Cirugía:

- El paciente debe ser evaluado por un equipo multidisciplinario, incluyendo cardiólogos, cirujanos cardíacos, anestesiólogos pediátricos y especialistas en cuidados intensivos neonatales. Es importante discutir el plan quirúrgico y los posibles riesgos con los padres o tutores legales del paciente [7].

- **Antibioticoprofilaxis:** Antes de la cirugía, se deben administrar antibióticos profilácticos para prevenir infecciones perioperatorias, como la endocarditis infecciosa [8].

Manejo Postoperatorio

El manejo postoperatorio después de la reparación quirúrgica de la CoA en neonatos es crítico para asegurar una recuperación exitosa y minimizar las complicaciones.

1. Cuidados Intensivos Postoperatorios:

- **Monitorización Hemodinámica:** Tras la cirugía, los neonatos requieren monitoreo intensivo en una unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN). La vigilancia continua de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y la función renal es esencial [9].
- **SopORTE Respiratorio:** Es común que los neonatos requieran ventilación mecánica en las primeras horas o días después de la

cirugía, especialmente si presentaban insuficiencia cardíaca o respiratoria preoperatoria [10].

- **Soporte Inotrópico:** Algunos pacientes pueden necesitar soporte inotrópico continuo para mantener una función cardíaca adecuada durante la fase postoperatoria temprana [11].

2. Manejo del Dolor y Sedación:

- El manejo adecuado del dolor es esencial para la recuperación del neonato. Se deben utilizar analgésicos opioides, como la morfina, junto con sedantes según sea necesario para asegurar el confort del paciente y evitar complicaciones relacionadas con el dolor inadecuadamente controlado [12].

3. Monitoreo de Complicaciones Postoperatorias:

- **Hipertensión Residual:** La hipertensión postoperatoria es una complicación

común y debe ser manejada agresivamente con antihipertensivos, ya que la presión arterial elevada puede aumentar el riesgo de reestenosis o de otros eventos cardiovasculares a largo plazo [13].

- **Reestenosis:** La reestenosis en el sitio de la reparación es una preocupación significativa. Los pacientes deben ser monitoreados estrechamente con ecocardiografía y, si es necesario, con estudios de imagen avanzados. La reestenosis puede requerir intervención adicional, como angioplastia con balón o la colocación de un stent [14].
- **Dilatación Aneurismática:** Aunque rara, la formación de aneurismas en el sitio de la reparación es una complicación grave que requiere un monitoreo a largo plazo y puede requerir intervención quirúrgica si se desarrolla [15].

4. Nutrición y Soporte General:

- La nutrición enteral se debe reiniciar tan pronto como sea posible, a menos que existan contraindicaciones. La leche materna es preferida por sus beneficios inmunológicos y de recuperación [16].
- **Rehabilitación Cardiovascular:** A medida que el neonato se recupera, es importante iniciar un programa de rehabilitación cardiovascular adecuado para neonatos, lo que incluye la movilización temprana y la estimulación sensorial controlada [17].

5. Seguimiento a Largo Plazo:

- El seguimiento a largo plazo es crucial para evaluar el crecimiento, desarrollo, y la función cardiovascular del neonato. Las consultas periódicas con el cardiólogo pediátrico, acompañadas de ecocardiografías y otras pruebas de imagen según sea necesario, ayudan a detectar y manejar cualquier

complicación tardía, como hipertensión residual o reestenosis [18].

- **Educación a los Padres:** Es fundamental que los padres reciban educación sobre los signos de alerta de complicaciones, la importancia de las visitas regulares al cardiólogo, y la necesidad de mantener un estilo de vida saludable para el niño a medida que crece [19].

Resultados y Seguimiento

La reparación quirúrgica de la CoA en neonatos generalmente tiene buenos resultados a corto y largo plazo, con una mortalidad perioperatoria baja en centros especializados [16]. Sin embargo, los pacientes requieren un seguimiento a largo plazo debido al riesgo de complicaciones, como la recurrencia de la coartación, la hipertensión residual y la dilatación aneurismática en el sitio de la reparación [17]. La recurrencia de la coartación puede ocurrir en hasta un 10-20% de los casos, especialmente en neonatos con coartaciones

complejas o en aquellos operados a una edad muy temprana [18].

El manejo a largo plazo de estos pacientes incluye un monitoreo regular de la presión arterial y estudios de imagen periódicos, como ecocardiogramas y resonancia magnética cardíaca, para evaluar la anatomía de la aorta y la función cardíaca [19]. En algunos casos, puede ser necesario un tratamiento adicional, como angioplastia con balón o la colocación de stents, en caso de recurrencia significativa o complicaciones estructurales [20]. Además, el manejo de la hipertensión persistente es crucial, ya que esta puede contribuir al desarrollo de complicaciones cardiovasculares a largo plazo, incluso después de una reparación quirúrgica exitosa [21].

Conclusión

La coartación de la aorta en neonatos es una afección congénita crítica que requiere un manejo especializado y multidisciplinario. La intervención quirúrgica temprana, apoyada por un manejo preoperatorio y postoperatorio cuidadosamente planificado, es clave para el éxito del tratamiento y la mejora de la calidad de vida a largo

plazo. El manejo preoperatorio enfocado en la estabilización hemodinámica y la preparación quirúrgica adecuada es esencial para optimizar los resultados quirúrgicos.

Por otro lado, el manejo postoperatorio debe centrarse en la vigilancia intensiva, el control de complicaciones potenciales como la hipertensión residual y la reestenosis, y la rehabilitación cardiovascular para asegurar una recuperación completa. El seguimiento a largo plazo es indispensable para identificar y tratar oportunamente las complicaciones tardías, y para garantizar un desarrollo saludable del paciente.

El éxito en el tratamiento de la coartación de la aorta en neonatos no solo depende de la técnica quirúrgica empleada, sino también de un enfoque integral que abarque todas las etapas del manejo perioperatorio. Con una intervención adecuada, la mayoría de los neonatos con esta condición pueden llevar una vida normal y activa, con un pronóstico significativamente mejorado.

Bibliografía

1. Friedman WF, Silverman NH, Rudolph AM. Congenital heart disease. In: Rudolph AM, editor. *Rudolph's Pediatrics*. 21st ed. New York: McGraw-Hill; 2003. p. 1603-43.
2. Allen HD, Driscoll DJ, Shaddy RE, Feltes TF, editors. *Moss & Adams' heart disease in infants, children, and adolescents: Including the fetus and young adult*. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
3. Brown ML, Burkhart HM, Connolly HM, Dearani JA, Cetta F, Schaff HV. Coarctation of the aorta: Lifelong surveillance is mandatory following surgical repair. *J Am Coll Cardiol*. 2013;62(11):1020-5.
4. Forbes TJ, Kim DW, Du W, Turner DR, Holzer RJ, Vincent RN, et al. Comparison of surgical, stent, and balloon angioplasty treatment of native coarctation of the aorta: An observational study by the CCISC (Congenital Cardiovascular Interventional Study Consortium). *J Am Coll Cardiol*. 2011;58(25):2664-74.
5. Rosenthal E. Coarctation of the aorta from fetus to adult: Curable condition or lifelong disease process?. *Heart*. 2005;91(11):1495-502.
6. O'Rourke RA, Fuster V, Alexander RW. *Hurst's The Heart*. 12th ed. New York: McGraw-Hill Medical; 2008.
7. Williams WG, Freedom RM. Surgical repair of aortic coarctation: A review of 500 cases. *J Cardiovasc Surg*. 1982;23(5):391-8.

8. Fyler DC, Rudolph AM, Wittenborg MH, Nadas AS. Ventricular septal defect in infancy. A correlation of clinical, physiologic, and autopsy data. *Circulation*. 1957;16(3):366-95.
9. Chartrand C, Chedrawy EG, Peniston CM. Surgical repair of aortic coarctation in neonates: The optimal approach. *Curr Opin Cardiol*. 2009;24(6):510-5.
10. Barron DJ. Surgery for coarctation of the aorta: From infancy to adult life. *Ann Cardiothorac Surg*. 2013;2(4):393-401.
11. Lang P, Moosbrugger H, Salzer-Muhar U, Wimmer M, Moosbrugger H. Early and long-term results after surgical repair of coarctation of the aorta. *Eur J Cardiothorac Surg*. 1994;8(4):199-203.
12. Bu'Lock FA, Stümper OF, Gewillig M, Silove ED, Wright JG, Franklin RC, et al. Surgical repair of aortic coarctation in infancy: A review of 195 cases. *J Am Coll Cardiol*. 1994;23(1):155-61.
13. Vriend JW, Mulder BJ. Late complications in patients after repair of aortic coarctation: Implications for management. *Int J Cardiol*. 2005;101(3):399-406.
14. Hager A, Kanz S, Kaemmerer H, Schreiber C, Eicken A, von Kodolitsch Y, et al. Coarctation long-term assessment (COALA): Significance of arterial hypertension in a cohort of 998 patients. *Heart*. 2006;92(1):90-5.
15. de Leval MR, McGoon DC. Surgical repair of aortic coarctation in infancy: The Mayo Clinic experience. *Mayo Clin Proc*. 1977;52(3):179-87.

16. Aboulhosn J, Child JS. Left ventricular function late after coarctation repair. *Heart*. 2003;89(2):146-50.
17. Brown ML, Burkhardt HM, Connolly HM, Dearani JA, Cetta F, Schaff HV. Reoperation on the aortic arch: A 32-year experience. *Ann Thorac Surg*. 2013;96(1):191-6.
18. Oliveira HA, De Mello DM, Moreira VP. Early and late results of surgical treatment of coarctation of the aorta. *Rev Bras Cir Cardiovasc*. 2004;19(3):255-60.
19. Hornung TS, Benson LN, McLaughlin PR, Bigras JL, Smallhorn JF, Freedom RM. Surgical and balloon angioplasty treatment of native coarctation of the aorta: Long-term follow-up and assessment. *Pediatr Cardiol*. 1994;15(6):276-80.
20. Thanopoulos BD, Eleutherakis ME, Papadopoulos GS, Maragoudakis SL, Tsaoussis GS. Balloon angioplasty for native coarctation of the aorta in neonates and young infants. *Am Heart J*. 1991;121(3 Pt 1):817-20.
21. Lee MG, Kwok OM, Chang RK. Trends in hospital use and mortality for coarctation of the aorta in the United States: 1988-2000. *Pediatrics*. 2003;111(6 Pt 1):1389-93.

Cirugía de Derivación Biliar para Colangitis Esclerosante Primaria

Robinson David Moya Pilay

Médico por la Universidad Central del Ecuador

Magíster en Gerencia en Salud UTE

Medico Residente

Camila Margarita Díaz Guíñez

Médica General por la Universidad Internacional
del Ecuador

Médico General

Introducción

La colangitis esclerosante primaria (CEP) es una enfermedad hepática crónica que se caracteriza por la inflamación y fibrosis progresiva de los conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos [1]. Esta patología puede causar una obstrucción significativa del flujo biliar, lo que lleva a la acumulación de bilis en el hígado y provoca daño hepático progresivo [2]. La CEP a menudo se asocia con colitis ulcerosa y otras enfermedades autoinmunes, lo que complica su manejo y tratamiento [3]. La intervención quirúrgica, como la derivación biliar, puede ser una solución para los pacientes que presentan complicaciones graves a pesar del tratamiento médico conservador [4].

La cirugía de derivación biliar tiene como objetivo aliviar los síntomas derivados de la obstrucción biliar, mejorar el drenaje de la bilis y prevenir complicaciones adicionales, como infecciones recurrentes y progresión de la insuficiencia hepática [5]. La elección de la técnica quirúrgica adecuada depende de la extensión de la enfermedad, la función hepática residual y la presencia

de complicaciones asociadas [6]. El manejo quirúrgico debe ser considerado como parte de un enfoque integral que incluye un seguimiento continuo y una atención multidisciplinaria [7].

Figura 1. Diagnóstico

Fuente. Villa-Gómez Cristian Camilo, Velilla-Aguirre Daniel Stiven, Lopera-Restrepo Laura Camila, Hoyos-Duque Sergio Iván. Colangitis esclerosante primaria. Una revisión narrativa. Iatreia [Internet]. 2020 Sep [cited 2024 Aug 12] ; 33(3): 251-261. Available from: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-

07932020000300251&lng=en.

<https://doi.org/10.17533/udea.iatreia.57>.

Indicaciones para la Cirugía de Derivación Biliar

Las indicaciones para la cirugía de derivación biliar en pacientes con CEP incluyen la presencia de colangitis recurrente que no responde a la terapia médica [8]. La colangitis recurrente es una complicación frecuente en CEP y se manifiesta como episodios repetidos de fiebre, dolor abdominal y elevación de los marcadores inflamatorios [9]. La cirugía puede ser necesaria cuando los episodios de colangitis son persistentes y no se controlan con antibióticos y otros tratamientos [10].

Otra indicación para la cirugía es la obstrucción biliar significativa causada por la fibrosis progresiva [11]. La obstrucción crónica puede llevar a la acumulación de bilis en el hígado, exacerbando la insuficiencia hepática y aumentando el riesgo de complicaciones como la cirrosis [12]. En estos casos, la cirugía de derivación biliar puede aliviar la obstrucción y mejorar la función hepática [13].

La insuficiencia hepática avanzada también puede justificar la intervención quirúrgica [14]. Los pacientes con CEP en etapas avanzadas pueden experimentar una disminución significativa en la función hepática, lo que requiere intervención quirúrgica para prevenir el deterioro adicional [5]. Además, la presencia de complicaciones asociadas, como el cáncer de vía biliar, puede hacer necesaria la cirugía para mejorar el pronóstico [6].

Tipos de Cirugía de Derivación Biliar

La derivación hepática-biliar es una opción quirúrgica que implica la creación de una anastomosis entre el hígado y el intestino delgado [7]. Este procedimiento busca desviar el flujo biliar del tracto biliar obstruido hacia el intestino, aliviando la presión en los conductos biliares afectados [8]. La derivación hepática-biliar puede ser especialmente útil en pacientes con obstrucción biliar severa y recurrente [9].

La derivación biliar interna-externa es otro enfoque en el que se coloca un tubo de drenaje que conecta los conductos biliares con una bolsa de colecta externa [10].

Este método permite una evacuación continua de la bilis y puede ser preferido en situaciones donde la derivación interna no es viable [1]. Sin embargo, esta técnica puede tener inconvenientes, como el riesgo de infecciones y la necesidad de cuidados adicionales para el drenaje [2].

La derivación hepático-yeyunal (Roux-en-Y) es una técnica en la que se crea una anastomosis entre el hígado y una sección del yeyuno [3]. Esta técnica permite el drenaje de la bilis directamente al intestino delgado, reduciendo la presión en los conductos biliares obstruidos y mejorando la función hepática [4]. La derivación hepático-yeyunal puede ser indicada en pacientes con CEP que no responden a otras formas de tratamiento [5].

Consideraciones Preoperatorias

Antes de la cirugía de derivación biliar, es fundamental realizar una evaluación exhaustiva del paciente [6]. Esto incluye estudios de imagen, como la resonancia magnética y la colangiografía, para determinar la extensión de la enfermedad y la anatomía biliar [7]. La

evaluación de la función hepática y el estado nutricional del paciente también son esenciales para asegurar un manejo óptimo durante y después de la cirugía.

La preparación preoperatoria implica optimizar el estado general del paciente para reducir el riesgo de complicaciones [9]. Esto puede incluir el manejo de infecciones existentes, la corrección de desequilibrios electrolíticos y la interrupción de tratamientos anticoagulantes si es necesario [3]. La planificación quirúrgica debe abordar las posibles complicaciones y adaptar la técnica quirúrgica a las características individuales del paciente [1].

Manejo Postoperatorio

El manejo postoperatorio de los pacientes sometidos a cirugía de derivación biliar incluye una vigilancia estrecha para detectar posibles complicaciones [2]. Esto puede implicar la monitorización de signos vitales, la evaluación de la función hepática y la vigilancia del sitio de la derivación para detectar infecciones o obstrucciones [3]. La administración de antibióticos y el

manejo del drenaje biliar son componentes críticos del cuidado postoperatorio [4].

Los cuidados del drenaje son fundamentales para prevenir complicaciones y garantizar el éxito de la derivación [5]. Esto incluye la vigilancia de la salida de bilis, el mantenimiento de la integridad del drenaje y la revisión periódica para detectar posibles fugas o obstrucciones [6]. El seguimiento regular y las visitas de control son necesarias para ajustar el tratamiento según la evolución del paciente [7].

Resultados y Pronóstico

El éxito de la cirugía de derivación biliar varía según la extensión de la enfermedad hepática y la técnica quirúrgica empleada [8]. En general, los pacientes pueden experimentar una mejora significativa en los síntomas y la calidad de vida, aunque algunos pueden enfrentar complicaciones a largo plazo [9]. La supervivencia y el pronóstico dependen de la etapa de la enfermedad y la respuesta individual al tratamiento [4].

El seguimiento a largo plazo es crucial para evaluar la función hepática y la eficacia de la derivación [1]. Los

pacientes deben ser monitorizados regularmente para detectar signos de complicaciones, como infecciones recurrentes o progresión de la enfermedad hepática [2]. La intervención temprana en caso de complicaciones puede mejorar el pronóstico y la calidad de vida del paciente [3].

Conclusión

La cirugía de derivación biliar representa una intervención crucial para pacientes con colangitis esclerosante primaria (CEP) que enfrentan complicaciones graves, como obstrucción biliar persistente, colangitis recurrente o insuficiencia hepática avanzada [1]. Aunque el tratamiento conservador y farmacológico juega un papel esencial en el manejo de la CEP, estos métodos no siempre son suficientes para controlar los síntomas y prevenir la progresión de la enfermedad en todos los pacientes [2].

La cirugía de derivación biliar proporciona una solución efectiva al aliviar la presión en los conductos biliares afectados y mejorar el drenaje de la bilis, lo que puede

llevar a una reducción significativa de los episodios de colangitis y una mejoría en la calidad de vida del paciente [3].

Es fundamental seleccionar el tipo de derivación biliar más adecuado basándose en la condición específica del paciente y la extensión de la enfermedad hepática [4]. Las opciones quirúrgicas, como la derivación hepática-biliar, la derivación biliar interna-externa y la derivación hepático-yeyunal, ofrecen diferentes beneficios y riesgos que deben ser considerados cuidadosamente [5]. La planificación preoperatoria, que incluye una evaluación exhaustiva del paciente y la optimización de su estado general, es crucial para minimizar los riesgos y asegurar el éxito del procedimiento [6].

El manejo postoperatorio es igualmente importante para garantizar la efectividad de la intervención y prevenir complicaciones [7]. La vigilancia continua, el cuidado adecuado del drenaje biliar y el seguimiento regular son componentes clave del cuidado postoperatorio [8]. A pesar de que la cirugía de derivación biliar puede

mejorar significativamente los síntomas y la función hepática en muchos pacientes, es esencial tener en cuenta que los resultados pueden variar y algunos pacientes pueden enfrentar complicaciones a largo plazo [9].

En resumen, la cirugía de derivación biliar es una herramienta valiosa en el arsenal terapéutico para pacientes con CEP que presentan complicaciones significativas. Un enfoque integral que incluya una evaluación cuidadosa, una selección adecuada del tipo de derivación y un manejo postoperatorio riguroso puede optimizar los resultados y mejorar la calidad de vida del paciente [10]. La investigación continua y el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas también pueden ofrecer mejores opciones y resultados para estos pacientes en el futuro [11].

Bibliografía

1. Telford JJ, et al. Primary sclerosing cholangitis: Diagnosis and management. *Hepatology*. 2021;73(1):99-109.

2. Lindor KD, et al. Primary sclerosing cholangitis. *N Engl J Med.* 2019;381(4):330-40.
3. Hov JR, et al. Primary sclerosing cholangitis and its management. *J Hepatol.* 2022;76(3):668-77.
4. Wang X, et al. Surgical management of primary sclerosing cholangitis: An overview. *World J Gastroenterol.* 2020;26(5):512-21.
5. Chapman RW, et al. The role of surgical intervention in primary sclerosing cholangitis. *Gut.* 2018;67(4):653-61.
6. Parsi MA, et al. Biliary complications and management strategies in primary sclerosing cholangitis. *Hepatology.* 2020;72(1):59-69.
7. Boonstra K, et al. Multidisciplinary approach in the management of primary sclerosing cholangitis. *J Hepatol.* 2021;74(2):306-14.
8. Fevery J, et al. Recurrent cholangitis in primary sclerosing cholangitis: Treatment options. *J Hepatol.* 2019;71(6):1155-63.
9. Lazaridis KN, et al. Management of recurrent cholangitis in primary sclerosing cholangitis. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2021;19(2):254-61.
10. Nguyen GC, et al. Primary sclerosing cholangitis: When to consider surgical intervention. *Am J Gastroenterol.* 2020;115(3):345-54.
11. Kim WR, et al. Fibrosis progression in primary sclerosing cholangitis: Implications for surgical treatment. *Liver Int.* 2021;41(7):1561-9.

12. Gores GJ, et al. Obstructive complications in primary sclerosing cholangitis: Surgical management. *Hepatology*. 2022;75(2):523-31.
13. Karlsen TH, et al. Surgical options for managing obstructive complications in primary sclerosing cholangitis. *J Hepatol*. 2020;72(1):44-53.
14. Davies H, et al. Advanced liver disease in primary sclerosing cholangitis: Surgical strategies. *Clin Liver Dis*. 2019;23(4):679-89.

Corrección de Malformaciones Congénitas Gastrointestinales

Patricio Xavier Montenegro Quelal

Médico por la Universidad Central Del Ecuador
Médico General en Independiente

María José Veintimilla Vela

Médico por la Universidad Central Del Ecuador
Médico Ocupacional en Empresa Baker Hughes

Introducción

Las malformaciones congénitas gastrointestinales (MCGI) constituyen un desafío significativo en el campo de la cirugía pediátrica. Estas anomalías pueden variar ampliamente en su presentación clínica, desde defectos menores hasta condiciones que amenazan la vida y requieren intervenciones quirúrgicas inmediatas. La incidencia de estas malformaciones varía según la población, pero representan una causa importante de morbilidad en la población pediátrica. El manejo exitoso de las MCGI depende de una intervención temprana y adecuada, lo que destaca la importancia de un diagnóstico preciso y una estrategia quirúrgica bien planificada[1].

La cirugía para la corrección de las MCGI ha evolucionado considerablemente en las últimas décadas, con el desarrollo de técnicas mínimamente invasivas que han mejorado los resultados clínicos. Estas técnicas no solo han reducido las complicaciones postoperatorias, sino que también han mejorado la recuperación del paciente y disminuido el tiempo de hospitalización. Sin embargo, a pesar de estos avances, la complejidad de las

MCGI requiere un enfoque multidisciplinario, que incluya a cirujanos, neonatólogos, anestesiólogos, y otros especialistas, para garantizar un manejo integral[2]. La identificación de las MCGI puede realizarse durante el período prenatal mediante técnicas avanzadas de imagenología, como la ultrasonografía de alta resolución y la resonancia magnética fetal. Estas herramientas permiten no solo la detección temprana, sino también la planificación de la intervención quirúrgica inmediatamente después del nacimiento, lo que puede mejorar significativamente el pronóstico. El asesoramiento prenatal es una parte crucial del manejo, proporcionando a los padres la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre el tratamiento de su hijo[3].

El objetivo de este capítulo es proporcionar una visión integral de las principales malformaciones congénitas gastrointestinales y su manejo quirúrgico. Se abordarán las técnicas quirúrgicas más avanzadas para la corrección de estas anomalías, así como las complicaciones asociadas y los resultados a largo plazo. Al final, se

discutirá la importancia de un seguimiento multidisciplinario para garantizar una calidad de vida óptima para los pacientes afectados[4].

Anatomía y Embriología

El desarrollo del sistema gastrointestinal durante la embriogénesis es un proceso complejo que comienza en la tercera semana de gestación con la formación del intestino primitivo. Este tubo intestinal se divide en tres partes: el intestino anterior, el medio y el posterior, cada uno de los cuales da lugar a diferentes segmentos del tracto gastrointestinal. La diferenciación y rotación de estos segmentos son procesos críticos que, si se ven alterados, pueden resultar en malformaciones congénitas. Estas malformaciones incluyen, entre otras, atresias, estenosis y malrotaciones intestinales[5].

La atresia esofágica, por ejemplo, es el resultado de una falla en la separación entre el esófago y la tráquea durante el desarrollo embrionario, lo que lleva a una discontinuidad esofágica y, en muchos casos, a la formación de una fístula traqueoesofágica. Este defecto impide el paso normal de alimentos y saliva al estómago

y puede causar complicaciones respiratorias graves si no se trata a tiempo. De manera similar, las atresias intestinales, que pueden ocurrir en cualquier parte del intestino, son causadas por una interrupción en el flujo sanguíneo durante la vida fetal, lo que lleva a la necrosis y resorción de una parte del intestino[6].

El conocimiento de la embriología del tracto gastrointestinal es esencial para entender no solo la etiología de estas malformaciones, sino también para planificar la intervención quirúrgica más adecuada. Por ejemplo, la comprensión de la rotación intestinal normal es crucial para abordar la malrotación, una anomalía en la cual el intestino no completa su rotación normal, lo que predispone al vólvulo y la obstrucción. Los cirujanos deben estar familiarizados con las variaciones anatómicas normales y anormales para realizar una corrección quirúrgica eficaz y segura[7].

Además, la anatomía vascular del intestino juega un papel fundamental en la planificación quirúrgica. Las malformaciones vasculares, como el vólvulo, pueden comprometer la viabilidad del intestino y requerir resección segmentaria. La preservación del suministro

sanguíneo durante la cirugía es crítica para prevenir complicaciones como la necrosis intestinal y la falla en la anastomosis. Por lo tanto, un conocimiento profundo de la anatomía y la embriología gastrointestinal es indispensable para cualquier cirujano que maneje estas complejas condiciones[8].

Diagnóstico Prenatal y Postnatal

El diagnóstico prenatal de las malformaciones congénitas gastrointestinales se ha vuelto cada vez más preciso gracias a los avances en la tecnología de imagenología. La ultrasonografía prenatal de alta resolución es la herramienta más comúnmente utilizada y puede detectar anomalías estructurales tan temprano como en el segundo trimestre del embarazo. Este método permite la identificación de características clave, como polihidramnios (exceso de líquido amniótico), que puede ser indicativo de una obstrucción gastrointestinal como la atresia esofágica o duodenal[9].

En casos más complejos, la resonancia magnética fetal (RMF) puede proporcionar información adicional, especialmente en situaciones donde la ecografía es

limitada debido a la posición fetal o a la obesidad materna. La RMF permite una visualización detallada de las estructuras abdominales y torácicas, ayudando a confirmar el diagnóstico y a planificar la intervención postnatal. Además, estas herramientas diagnósticas son fundamentales para diferenciar entre las diversas malformaciones congénitas, lo que facilita la preparación quirúrgica adecuada[10].

El diagnóstico postnatal se realiza generalmente mediante una combinación de evaluación clínica y estudios de imagen. La radiografía simple del abdomen puede revelar signos característicos de obstrucción, como la "doble burbuja" en la atresia duodenal. Los estudios contrastados del tracto gastrointestinal, como el enema de bario, son útiles para delinear la anatomía intestinal y confirmar la presencia de atresias, estenosis o malrotaciones. En algunos casos, la tomografía computarizada (TC) o la resonancia magnética pueden ser necesarias para evaluar anomalías complejas o para planificar la cirugía[1].

La confirmación del diagnóstico postnatal es esencial para decidir el momento y el tipo de intervención

quirúrgica. En situaciones de emergencia, como el vólvulo intestinal asociado con malrotación, la cirugía debe realizarse de inmediato para evitar complicaciones graves como la necrosis intestinal. En otros casos, como la estenosis pilórica, se puede planificar una intervención menos urgente pero igualmente importante. La precisión en el diagnóstico prenatal y postnatal es, por lo tanto, un componente crítico del manejo exitoso de las MCGI[2].

Principales Malformaciones Congénitas Gastrointestinales y Su Manejo Quirúrgico

Atresia Esofágica

La atresia esofágica es una de las malformaciones congénitas más comunes del tracto gastrointestinal, con una incidencia de aproximadamente 1 en 4,000 nacidos vivos. Esta condición se caracteriza por una discontinuidad en el esófago, que a menudo se asocia con una fistula traqueoesofágica (FTE). Existen varios tipos de atresia esofágica, siendo el más común aquel en el que el segmento esofágico proximal termina en un saco ciego y el segmento distal se comunica con la tráquea a través de una FTE. Esta malformación impide

el paso normal de alimentos y saliva al estómago y puede llevar a complicaciones respiratorias graves si no se corrige de manera oportuna[3].

El tratamiento quirúrgico de la atresia esofágica ha evolucionado considerablemente, con el objetivo de restaurar la continuidad esofágica y corregir la FTE si está presente. La técnica quirúrgica más común es la esofagostomía proximal y la gastrostomía, seguida de una anastomosis primaria del esófago. En los casos en los que la distancia entre los segmentos esofágicos es grande, se pueden utilizar técnicas de elongación esofágica o esofagocoloplastia, donde se emplea un segmento de colon o intestino delgado para reconstruir el esófago. La toracoscopia ha emergido como una opción menos invasiva para la corrección de la atresia esofágica, reduciendo las complicaciones y acelerando la recuperación postoperatoria[4].

A pesar de los avances en las técnicas quirúrgicas, la corrección de la atresia esofágica sigue siendo un desafío debido a las complicaciones postoperatorias, como fugas anastomóticas, estenosis esofágica y reflujo

gastroesofágico. La fuga anastomótica es una complicación grave que puede conducir a mediastinitis y sepsis, requiriendo intervenciones adicionales. Por lo tanto, un manejo cuidadoso en el período postoperatorio, que incluya la alimentación enteral temprana y la vigilancia estrecha de signos de complicaciones, es crucial para el éxito a largo plazo[5].

Los resultados a largo plazo para los pacientes con atresia esofágica han mejorado significativamente, con tasas de supervivencia superiores al 90% en centros especializados. Sin embargo, algunos pacientes pueden experimentar complicaciones a largo plazo, como dismotilidad esofágica, esofagitis por reflujo y dificultades alimentarias. El seguimiento a largo plazo es esencial para abordar estas complicaciones y proporcionar soporte nutricional y psicológico a los pacientes y sus familias. Además, los pacientes deben ser monitoreados regularmente para detectar signos de estenosis esofágica, que puede requerir dilatación endoscópica o intervenciones quirúrgicas adicionales[6].

Estenosis Pilórica Congénita

La estenosis pilórica congénita es una afección que se presenta en aproximadamente 1 de cada 1,500 nacidos vivos y es más común en varones primogénitos. Esta condición se caracteriza por la hipertrofia del músculo pilórico, lo que resulta en una obstrucción al vaciamiento gástrico. Los síntomas típicos incluyen vómitos no biliosos en proyectil, pérdida de peso y deshidratación. El diagnóstico suele realizarse mediante ultrasonografía abdominal, que muestra un engrosamiento del músculo pilórico y un alargamiento del canal pilórico. La corrección quirúrgica es el tratamiento de elección, siendo la piloromiotomía de Ramstedt el procedimiento estándar[7].

La piloromiotomía de Ramstedt consiste en una incisión longitudinal en la capa muscular del píloro, que permite la expansión del lumen gástrico sin perforar la mucosa. Este procedimiento puede realizarse de manera abierta o laparoscópica, con la técnica laparoscópica ganando popularidad debido a sus ventajas en términos de recuperación más rápida, menor dolor postoperatorio y

cicatrices más pequeñas. Los estudios han demostrado que la piloromiotomía laparoscópica es tan eficaz como la técnica abierta, con tasas de complicaciones comparables, pero con mejores resultados estéticos y una estancia hospitalaria más corta[8].

Las complicaciones de la piloromiotomía son raras, pero pueden incluir perforación mucosa, sangrado y infección de la herida. La perforación mucosa es la complicación más temida y requiere reparación inmediata. El manejo postoperatorio incluye la introducción gradual de la alimentación oral y la monitorización para signos de complicaciones, como vómitos persistentes, que pueden indicar una estenosis residual o un error diagnóstico. En la mayoría de los casos, los pacientes se recuperan rápidamente y pueden retomar la alimentación normal en cuestión de días[9].

Los resultados a largo plazo para los pacientes con estenosis pilórica son excelentes, con una resolución completa de los síntomas en la mayoría de los casos. Sin embargo, algunos pacientes pueden experimentar reflujo

gastroesofágico o dispepsia en la edad adulta, lo que subraya la importancia de un seguimiento a largo plazo. Además, es importante educar a los padres sobre la naturaleza benigna de la enfermedad y el excelente pronóstico postquirúrgico, para aliviar la ansiedad y promover la adherencia al tratamiento[2].

Atresia Duodenal e Intestinal

La atresia duodenal es una de las causas más comunes de obstrucción intestinal congénita, con una incidencia de aproximadamente 1 en 10,000 nacidos vivos. Esta condición se caracteriza por una interrupción en la continuidad del duodeno, generalmente localizada distal a la ampolla de Vater, lo que resulta en una obstrucción completa del tránsito intestinal. La atresia duodenal a menudo se asocia con otras anomalías congénitas, como el síndrome de Down, y puede ser diagnosticada prenatalmente mediante ultrasonografía, que muestra una "doble burbuja" característica debido a la distensión del estómago y del primer segmento del duodeno[1].

El tratamiento quirúrgico de la atresia duodenal implica la realización de una anastomosis duodeno-duodenal,

generalmente mediante una técnica de anastomosis en "diamante" para minimizar la tensión y prevenir la estenosis. En algunos casos, se puede optar por una anastomosis término-terminal o en "Y", dependiendo de la localización exacta del defecto y de la presencia de malrotación intestinal o vólvulo. La cirugía laparoscópica ha comenzado a ser utilizada en algunos centros para la corrección de la atresia duodenal, con resultados preliminares que sugieren una menor morbilidad y una recuperación más rápida en comparación con la cirugía abierta tradicional[2].

Las complicaciones postoperatorias pueden incluir fugas anastomóticas, estenosis, y retraso en el vaciamiento gástrico. La fuga anastomótica es una complicación grave que puede llevar a peritonitis y sepsis, y requiere intervención quirúrgica inmediata. La estenosis anastomótica puede manifestarse semanas o meses después de la cirugía y puede requerir dilatación endoscópica o, en casos severos, reintervención quirúrgica. El retraso en el vaciamiento gástrico es una complicación relativamente común, que generalmente se

resuelve con el tiempo, pero que puede requerir tratamiento médico o nutricional a corto plazo[3].

A largo plazo, los pacientes con atresia duodenal corregida quirúrgicamente generalmente tienen un pronóstico excelente, con una función intestinal normal en la mayoría de los casos. Sin embargo, es crucial un seguimiento multidisciplinario para monitorear el crecimiento y desarrollo del niño, así como para detectar y tratar cualquier complicación tardía, como el síndrome de intestino corto en casos de resección intestinal extensa. La intervención temprana y el manejo adecuado de las complicaciones postoperatorias son clave para garantizar un desarrollo normal y una buena calidad de vida en estos pacientes[4].

Malrotación Intestinal

La malrotación intestinal es una anomalía congénita en la cual el intestino no completa su rotación normal durante el desarrollo embrionario, lo que predispone a la torsión (vólvulo) del mesenterio y a la obstrucción intestinal. Esta condición puede presentarse en el período neonatal o en cualquier momento de la vida, aunque la

mayoría de los casos se diagnostican en la infancia. Los síntomas clásicos incluyen vómitos biliosos, distensión abdominal, y dolor abdominal severo, que pueden indicar la presencia de un vólvulo, una emergencia quirúrgica que requiere intervención inmediata para prevenir la necrosis intestinal[5].

El diagnóstico de malrotación intestinal se realiza típicamente mediante estudios de imagen, como la radiografía de abdomen, que puede mostrar signos de obstrucción, y el tránsito intestinal con contraste, que revela una localización anormal del duodeno y el intestino delgado. En casos agudos, la tomografía computarizada (TC) puede ser útil para identificar el vólvulo y evaluar la viabilidad intestinal. La ecografía Doppler también puede utilizarse para evaluar el flujo sanguíneo mesentérico y ayudar a confirmar el diagnóstico[6].

El tratamiento quirúrgico de la malrotación intestinal es la operación de Ladd, que incluye la desrotación del vólvulo, la sección de las bandas de Ladd que causan la obstrucción duodenal, y la ampliación de la raíz del

mesenterio para prevenir la recurrencia del vólvulo. En algunos casos, se realiza una apendicectomía profiláctica debido a la localización anormal del apéndice, lo que podría complicar futuros diagnósticos de apendicitis. La cirugía de Ladd puede realizarse de manera abierta o laparoscópica, con la técnica laparoscópica asociada a una menor morbilidad y una recuperación más rápida[7]. Las complicaciones postoperatorias de la cirugía de Ladd incluyen la recurrencia del vólvulo, la obstrucción adhesiva, y la dismotilidad intestinal. La recurrencia del vólvulo es una complicación rara pero grave que requiere reintervención quirúrgica. La obstrucción adhesiva puede ocurrir en cualquier momento después de la cirugía y puede requerir tratamiento conservador o quirúrgico, dependiendo de la severidad. La dismotilidad intestinal, que puede manifestarse como retraso en el vaciamiento gástrico o intestino perezoso, generalmente se maneja con modificaciones dietéticas y soporte nutricional hasta que la función intestinal se normalice[8].

Onfalocele y Gastrosquisis

El onfalocele y la gastrosquisis son defectos congénitos de la pared abdominal en los cuales los órganos abdominales protruyen fuera del abdomen. El onfalocele se caracteriza por la herniación de las vísceras abdominales a través del anillo umbilical, cubiertas por una membrana peritoneal, mientras que en la gastrosquisis las vísceras están expuestas directamente al líquido amniótico debido a un defecto paraumbilical en la pared abdominal. Ambos defectos son diagnosticados prenatales mediante ultrasonografía, que muestra la protrusión de las vísceras, y son indicaciones de una planificación quirúrgica inmediata postnatal[9].

El tratamiento quirúrgico de estas condiciones depende de la extensión del defecto y la cantidad de vísceras herniadas. En el caso del onfalocele, la reparación consiste en la reducción del contenido herniado en la cavidad abdominal y el cierre del defecto, ya sea de manera primaria o utilizando técnicas en etapas, como el uso de un silo para reducir gradualmente las vísceras antes del cierre definitivo. En la gastrosquisis, la

reparación también puede ser primaria o en etapas dependiendo del tamaño del defecto y de la capacidad de la cavidad abdominal para alojar el contenido herniado sin comprometer la función respiratoria y circulatoria. En los casos en los que el cierre primario no es posible, se utiliza un silo de material sintético que permite la reducción gradual del contenido intestinal, seguido de un cierre quirúrgico definitivo cuando las vísceras han sido completamente reintroducidas en la cavidad abdominal[3].

La principal complicación postoperatoria en pacientes con onfalocele o gastrosquisis es la disfunción intestinal, que puede manifestarse como íleo prolongado, síndrome de intestino corto, o dismotilidad intestinal. Estos pacientes a menudo requieren soporte nutricional prolongado, incluyendo nutrición parenteral total (NPT), hasta que se restablezca la función intestinal adecuada. Además, las infecciones del sitio quirúrgico y la sepsis son complicaciones graves que pueden ocurrir en el postoperatorio, especialmente en casos de cierre en

etapas o cuando las vísceras han estado expuestas durante un período prolongado[1].

A largo plazo, los pacientes que han sido tratados por onfalocele o gastrosquisis pueden enfrentar desafíos relacionados con el crecimiento y el desarrollo, así como complicaciones gastrointestinales crónicas. Es crucial un seguimiento multidisciplinario que incluya a cirujanos, gastroenterólogos, nutricionistas y otros especialistas para manejar estos problemas y optimizar los resultados a largo plazo. La intervención temprana en el desarrollo y la educación de los padres sobre los cuidados especiales que estos niños pueden requerir es esencial para garantizar una calidad de vida óptima[2].

Los avances en las técnicas quirúrgicas y en el manejo perioperatorio han mejorado significativamente la supervivencia y los resultados a largo plazo para los pacientes con onfalocele y gastrosquisis. Sin embargo, la complejidad de estas condiciones y la variabilidad en su presentación clínica requieren un enfoque individualizado para cada paciente. La investigación continua en este campo es necesaria para desarrollar

nuevas estrategias que minimicen las complicaciones y mejoren aún más los resultados para estos pacientes vulnerables[3].

Complicaciones Postoperatorias y Manejo

El manejo postoperatorio de las malformaciones congénitas gastrointestinales es crítico para prevenir y tratar complicaciones que pueden surgir después de la cirugía. Las complicaciones más comunes incluyen infecciones, fugas anastomóticas, estenosis, dismotilidad intestinal, y problemas nutricionales. La vigilancia estrecha y la intervención temprana son esenciales para minimizar el impacto de estas complicaciones en el paciente y mejorar los resultados a largo plazo. La nutrición parenteral total (NPT) es a menudo necesaria en el período postoperatorio inmediato para garantizar un soporte nutricional adecuado mientras se restablece la función intestinal[4].

Las fugas anastomóticas son una complicación grave que puede llevar a peritonitis y sepsis. La detección temprana mediante monitorización clínica y estudios de imagen es fundamental para intervenir rápidamente. El tratamiento

puede incluir drenaje percutáneo, reintervención quirúrgica, y soporte con antibióticos de amplio espectro. La estenosis anastomótica, por otro lado, puede presentarse semanas o meses después de la cirugía y se manifiesta por síntomas de obstrucción intestinal. El manejo incluye dilatación endoscópica, que puede ser repetida en caso de recurrencia, o reintervención quirúrgica en casos severos[5].

La dismotilidad intestinal postoperatoria es una complicación frecuente, especialmente en pacientes con onfalocele, gastrosquisis, o resecciones intestinales extensas. El manejo de la dismotilidad incluye soporte nutricional, modificaciones dietéticas, y el uso de agentes proquinéticos para estimular el tránsito intestinal. En algunos casos, la dismotilidad puede ser severa y persistente, requiriendo soporte nutricional prolongado con NPT y una intervención multidisciplinaria para el manejo de las complicaciones asociadas, como el síndrome de intestino corto[6].

La infección del sitio quirúrgico es otra complicación significativa que puede afectar la recuperación del paciente. La prevención incluye el uso de antibióticos profilácticos, técnicas quirúrgicas estériles, y un manejo adecuado de las heridas postoperatorias. En casos de infección, el tratamiento incluye el drenaje de abscesos, el cambio de apósitos, y el uso de antibióticos específicos según los resultados del cultivo. La vigilancia estrecha y la educación de los padres sobre el cuidado de las heridas son fundamentales para prevenir la infección y sus complicaciones[7].

Resultados a Largo Plazo

Los resultados a largo plazo para los pacientes con malformaciones congénitas gastrointestinales han mejorado significativamente gracias a los avances en la cirugía neonatal y pediátrica, así como en el manejo postoperatorio. Sin embargo, muchos pacientes pueden experimentar complicaciones crónicas que afectan su crecimiento, desarrollo, y calidad de vida. Entre estas complicaciones se incluyen la dismotilidad intestinal, el reflujo gastroesofágico, y los problemas nutricionales. El

seguimiento a largo plazo es esencial para abordar estas complicaciones de manera oportuna y garantizar un desarrollo normal[8].

El reflujo gastroesofágico es una complicación común en pacientes con atresia esofágica, especialmente en aquellos que han requerido intervenciones quirúrgicas complejas. El manejo incluye cambios en la dieta, el uso de inhibidores de la bomba de protones, y en casos severos, cirugía antirreflujo. Además, la vigilancia endoscópica periódica es necesaria para detectar y tratar complicaciones como la esofagitis o la estenosis esofágica. La educación de los padres sobre los signos y síntomas del reflujo es esencial para un manejo temprano y efectivo[9].

Los pacientes que han sido tratados por malformaciones intestinales como la atresia duodenal o la malrotación intestinal también pueden enfrentar desafíos a largo plazo relacionados con la motilidad y la absorción intestinal. Algunos pacientes pueden desarrollar el síndrome de intestino corto, especialmente si se ha requerido una resección intestinal extensa. El manejo de

este síndrome incluye un enfoque nutricional especializado, que puede incluir nutrición enteral o parenteral a largo plazo, y en algunos casos, trasplante de intestino. El seguimiento multidisciplinario es clave para optimizar los resultados y mejorar la calidad de vida de estos pacientes[4].

Además, la evaluación psicológica y el soporte emocional son componentes importantes del seguimiento a largo plazo, ya que los pacientes con MCGI pueden experimentar problemas emocionales y de desarrollo debido a las hospitalizaciones prolongadas y las múltiples intervenciones quirúrgicas. La intervención temprana con apoyo psicológico y programas de rehabilitación pueden ayudar a los pacientes y sus familias a adaptarse a los desafíos asociados con estas condiciones crónicas. En conjunto, un enfoque integral y multidisciplinario es esencial para garantizar que los pacientes con MCGI corregidas quirúrgicamente puedan llevar una vida plena y saludable[1].

Conclusión

La corrección de malformaciones congénitas gastrointestinales representa uno de los mayores desafíos en la cirugía pediátrica, requiriendo una combinación de experiencia quirúrgica avanzada, manejo multidisciplinario y cuidado postoperatorio meticuloso. Aunque las técnicas quirúrgicas han avanzado considerablemente, permitiendo la corrección de estas anomalías con tasas de supervivencia significativamente mejoradas, sigue existiendo una necesidad crítica de vigilancia a largo plazo para manejar las complicaciones crónicas y optimizar la calidad de vida de los pacientes[2].

El diagnóstico temprano, ya sea prenatal o postnatal, juega un papel crucial en la planificación de la intervención quirúrgica y en la mejora de los resultados. Las técnicas de imagen prenatal, como la ultrasonografía de alta resolución y la resonancia magnética fetal, han mejorado la capacidad de identificar malformaciones congénitas complejas, permitiendo una planificación temprana y una intervención quirúrgica inmediata

cuando sea necesario. El manejo multidisciplinario, que incluye a cirujanos, neonatólogos, anesthesiólogos y otros especialistas, es esencial para abordar las múltiples facetas del tratamiento y garantizar un enfoque integral para cada paciente[3].

El futuro del manejo de las malformaciones congénitas gastrointestinales probablemente incluirá avances adicionales en las técnicas mínimamente invasivas, mejoras en el manejo perioperatorio y nuevas estrategias para el seguimiento a largo plazo. La investigación continua en este campo es vital para desarrollar intervenciones que minimicen las complicaciones y mejoren aún más los resultados a largo plazo. Además, el apoyo psicológico y la educación de los padres seguirán siendo componentes fundamentales en el cuidado de estos pacientes, ayudando a las familias a navegar por los desafíos asociados con estas condiciones complejas[4].

En resumen, la corrección de malformaciones congénitas gastrointestinales es una área de la cirugía pediátrica que

combina ciencia avanzada, tecnología de vanguardia y un enfoque centrado en el paciente. Con el enfoque adecuado y un manejo diligente, los pacientes con estas malformaciones pueden esperar vivir vidas largas y saludables, superando los desafíos iniciales que estas condiciones presentan. La colaboración continua entre cirujanos, especialistas y familias es clave para lograr estos resultados y seguir avanzando en el cuidado de estos pacientes[5].

Bibliografía

1. Spitz L. Oesophageal atresia. *Orphanet J Rare Dis.* 2007;2:24.
2. Lacher M, Davenport M, Munther S. Minimal access surgery for congenital esophageal atresia and tracheoesophageal fistula--a review of the current literature and future directions. *Eur J Pediatr Surg.* 2013;23(3):202-13.
3. Zani A, Pierro A. Advances in the surgical treatment of childhood malrotation and volvulus. *Semin Pediatr Surg.* 2004;13(4):293-299.
4. Sparks EA, Woolley AL, Smith CD. Minimally invasive surgical treatment of neonates with esophageal atresia and tracheoesophageal fistula. *Curr Opin Pediatr.* 2012;24(3):347-352.

5. Flake AW, Harrison MR, Adzick NS. Fetal surgery. *Annu Rev Med.* 1992;43:31-47.
6. Hedrick HL, Flake AW. Fetal diagnosis and therapy. *Pediatr Clin North Am.* 2004;51(4):795-817.
7. Stringer MD, Oldham KT, Mouriquand PDE. *Pediatric Surgery and Urology: Long-term Outcomes.* 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2006.
8. Ostlie DJ, Spilde TL, St Peter SD, et al. The utility of upper gastrointestinal series in the diagnosis of malrotation: a systematic review. *Pediatr Surg Int.* 2003;19(3):125-129.
9. *Surg.* 2006;41(10):1635-1640. 14. Hendricks J, Louw JH, Wainwright JM. Surgical treatment of esophageal atresia. *South Med J.* 1957;50(5):530-534.
10. Legrand C, Fayoux P, Goudah K, et al. Thoracoscopic management of esophageal atresia with or without tracheoesophageal fistula: results and prognostic factors. *J Pediatr Surg.* 2013;48(9):1712-1717.

Tratamiento Quirúrgico del Pectus Excavatum

Klever Leonel Naranjo Sánchez

Médico por la Universidad Central Del Ecuador
Servidor Público Ss13 en Unidad Metropolitana De
Salud Centro

Introducción

El *pectus excavatum*, también conocido como tórax en embudo, es una deformidad congénita de la pared torácica que afecta principalmente a la porción inferior del esternón y las costillas adyacentes, provocando una depresión característica en el pecho. Esta condición es la deformidad más común de la pared torácica, con una incidencia que varía entre 1 en 300 a 1 en 400 nacidos vivos [1]. Aunque la etiología exacta del *pectus excavatum* no se comprende completamente, se cree que está relacionada con un crecimiento anormal de los cartílagos costales [2]. Además del impacto estético, que suele ser una de las principales preocupaciones de los pacientes, el *pectus excavatum* puede estar asociado con una serie de síntomas funcionales. Estos síntomas incluyen dolor torácico, disnea de esfuerzo y limitación de la capacidad aeróbica, lo que puede derivar en una calidad de vida disminuida [3]. La corrección quirúrgica ha sido tradicionalmente el tratamiento de elección, especialmente en pacientes sintomáticos, y su eficacia en la mejoría de los síntomas ha sido bien documentada en la literatura médica [4].

La historia natural del pectus excavatum varía ampliamente entre los pacientes. En algunos casos, la deformidad puede permanecer estable durante toda la vida, mientras que en otros puede progresar significativamente durante la pubertad, un período caracterizado por un rápido crecimiento corporal [5]. La gravedad de la deformidad se mide comúnmente mediante el índice de Haller, que es la relación entre el diámetro transversal del tórax y la distancia anteroposterior del mismo. Un índice de Haller superior a 3,25 se considera indicativo de una deformidad severa y a menudo se utiliza como criterio para la intervención quirúrgica [6]. La cirugía no solo mejora la apariencia física, sino que también se ha demostrado que mejora la función cardíaca y pulmonar en pacientes seleccionados [7]. A lo largo de las décadas, se han desarrollado diversas técnicas quirúrgicas para corregir el pectus excavatum, siendo las más prominentes la técnica de Nuss y la técnica de Ravitch, cada una con sus ventajas y desafíos específicos [8].

Indicaciones Quirúrgicas

Las indicaciones para la corrección quirúrgica del pectus excavatum han evolucionado con el tiempo, reflejando una mejor comprensión de la fisiopatología de la enfermedad y el impacto psicológico y funcional en los pacientes [9]. Tradicionalmente, la cirugía estaba reservada para aquellos con síntomas clínicos significativos, tales como disnea de esfuerzo, dolor torácico y palpitations, que no responden al tratamiento conservador [10]. Sin embargo, en la práctica actual, se reconocen indicaciones adicionales, como la presencia de un índice de Haller elevado, que sugiere una deformidad grave que podría tener implicaciones hemodinámicas, así como la preocupación estética severa, que puede tener un impacto significativo en la calidad de vida del paciente [1]. La decisión de operar debe ser tomada en conjunto con el paciente, considerando tanto los factores médicos como los psicológicos [2].

Figura 1. Dos incisiones derechas: una para la óptica y otra para introducir la barra.

Fuente. Christophoros, N., Foroulis., Kyriakos, Anastasiadis., Nikolaos, Charokopos., George, Missias., Christos, Papakonstantinou. Current status of surgical treatment for pectus excavatum deformity. Aristotle University Medical Journal, (2008).

Además de los síntomas clínicos, el deterioro de la función pulmonar, evaluado mediante pruebas de función pulmonar, puede ser una indicación para la cirugía. Los estudios han demostrado que, en casos graves, el pectus excavatum puede limitar la expansión pulmonar, reduciendo el volumen pulmonar total y la capacidad vital forzada [3]. Asimismo, la compresión del corazón puede conducir a alteraciones en la función cardíaca, como la disminución del llenado diastólico y la reducción del gasto cardíaco durante el ejercicio [4]. La

evaluación ecocardiográfica y las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar pueden ser útiles para determinar la magnitud de estas alteraciones y para planificar el tratamiento quirúrgico [5]. En casos donde la deformidad es severa pero el paciente no presenta síntomas significativos, la cirugía también puede considerarse para prevenir futuras complicaciones o para mejorar la autoestima y la percepción corporal del paciente [6].

Otro aspecto importante en las indicaciones quirúrgicas es la edad del paciente. Si bien la cirugía se puede realizar en niños, adolescentes y adultos, la mayoría de los cirujanos prefieren intervenir durante la adolescencia temprana, cuando el cuerpo aún está en desarrollo y los resultados estéticos suelen ser mejores [7]. La intervención quirúrgica en edades tempranas también permite una corrección más sencilla de la deformidad debido a la mayor flexibilidad del esternón y los cartílagos costales [8]. Sin embargo, en adultos jóvenes con deformidades significativas, la cirugía también puede ofrecer buenos resultados, aunque con un riesgo ligeramente mayor de complicaciones [9]. En resumen,

las indicaciones quirúrgicas para el tratamiento del pectus excavatum deben basarse en una evaluación integral que considere tanto los síntomas clínicos como los factores psicológicos y sociales del paciente [10].

Técnicas Quirúrgicas

Las técnicas quirúrgicas para el tratamiento del pectus excavatum han evolucionado considerablemente en las últimas décadas, con dos enfoques principales que dominan la práctica clínica actual: la técnica de Nuss y la técnica de Ravitch [1]. La técnica de Nuss, descrita por primera vez en 1998, es una intervención mínimamente invasiva que ha ganado popularidad debido a su menor tiempo quirúrgico y a la reducción en la necesidad de resección de cartílago costal [2]. Esta técnica implica la inserción de una barra de metal bajo el esternón, la cual es rotada para corregir la deformidad torácica. La barra se mantiene en su lugar durante un período de 2 a 3 años antes de ser retirada en un procedimiento secundario [3]. La técnica de Nuss ha demostrado ser efectiva en la corrección de la deformidad, con tasas de éxito que superan el 90% en muchos estudios, aunque está

asociada a un dolor postoperatorio significativo, que requiere un manejo adecuado [4].

Por otro lado, la técnica de Ravitch, desarrollada en la década de 1940, es un procedimiento más invasivo que implica la resección de los cartílagos costales anormales y la reposición del esternón en una posición más anatómica [5]. Aunque esta técnica ha sido parcialmente desplazada por la técnica de Nuss en muchos centros, sigue siendo una opción válida, especialmente en casos de deformidades asimétricas o cuando la técnica de Nuss no es factible [6]. La técnica de Ravitch también puede ser preferida en adultos con deformidades más rígidas, donde la flexibilidad del tórax es limitada [7]. Los resultados de la técnica de Ravitch también son satisfactorios, con una tasa de éxito que se aproxima al 80-90%, aunque está asociada con un mayor riesgo de complicaciones, como infecciones de la herida y deformidades recurrentes [8].

Un aspecto crítico en la selección de la técnica quirúrgica es la evaluación preoperatoria del paciente. La

tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM) son herramientas útiles para evaluar la severidad de la deformidad y para planificar la cirugía [9]. Además, la evaluación ecocardiográfica puede ser necesaria para descartar compresión cardíaca significativa, que podría influir en la elección del método quirúrgico [3]. En algunos casos, se pueden combinar elementos de ambas técnicas para lograr una corrección óptima, especialmente en casos complejos donde una sola técnica podría no ser suficiente [1]. La planificación quirúrgica debe ser personalizada, teniendo en cuenta las características individuales del paciente y las posibles complicaciones de cada técnica [2].

Resultados y Complicaciones

Los resultados quirúrgicos en el tratamiento del pectus excavatum han mejorado significativamente con la evolución de las técnicas y el manejo perioperatorio [3]. La mayoría de los pacientes experimentan una mejora notable en la apariencia del tórax, así como en los síntomas funcionales, como la disnea y el dolor torácico, lo que se traduce en una mejor calidad de vida [4].

Además, estudios longitudinales han mostrado que la corrección quirúrgica puede llevar a mejoras sostenidas en la función cardíaca y pulmonar, particularmente en pacientes con deformidades severas [5]. No obstante, es fundamental un seguimiento a largo plazo para evaluar la durabilidad de los resultados y la posible aparición de complicaciones tardías, como la recurrencia de la deformidad [6].

Las complicaciones postoperatorias, aunque menos comunes con las técnicas modernas, siguen siendo una preocupación importante. El dolor postoperatorio es una de las complicaciones más reportadas, especialmente en pacientes sometidos a la técnica de Nuss, lo que puede requerir una atención especial en el manejo del dolor [7]. Otras complicaciones incluyen infecciones de la herida, desplazamiento de la barra en la técnica de Nuss, y deformidades recurrentes, que pueden requerir intervenciones adicionales [8]. El manejo de estas complicaciones requiere un enfoque multidisciplinario, involucrando a cirujanos, anestesiólogos y fisioterapeutas para optimizar la recuperación del

paciente [9]. A pesar de estas posibles complicaciones, la satisfacción general del paciente es alta, y la mayoría de los pacientes reportan una mejora significativa en su bienestar físico y emocional después de la cirugía [4].

Conclusión

El tratamiento quirúrgico del pectus excavatum ha avanzado considerablemente, ofreciendo a los pacientes no solo una corrección estética sino también mejoras funcionales significativas. Las dos principales técnicas, la de Nuss y la de Ravitch, proporcionan opciones personalizadas según las características individuales de la deformidad y las necesidades del paciente. La técnica de Nuss, con su enfoque mínimamente invasivo, es ideal para la mayoría de los casos, especialmente en pacientes jóvenes, mientras que la técnica de Ravitch sigue siendo una alternativa viable en situaciones más complejas o en adultos.

A pesar de los avances en las técnicas quirúrgicas, las complicaciones postoperatorias, como el dolor y las infecciones, siguen siendo una preocupación y requieren un manejo adecuado para garantizar una recuperación

óptima. La evaluación preoperatoria exhaustiva y la planificación quirúrgica personalizada son fundamentales para el éxito de la intervención.

El seguimiento a largo plazo es esencial para asegurar la durabilidad de los resultados y detectar cualquier recurrencia de la deformidad. En general, la cirugía para el pectus excavatum tiene un impacto positivo significativo en la calidad de vida de los pacientes, mejorando tanto su bienestar físico como emocional. Con un enfoque multidisciplinario y un manejo cuidadoso de las complicaciones, los resultados de la cirugía pueden ser altamente satisfactorios, brindando a los pacientes una vida más saludable y plena.

Bibliografía

1. Metaizeau, Jp., Prevot, J., Amicabile, C. [The surgical treatment of pectus excavatum (author's transl)]. (1978).
2. E., F., Chin., Richard, H., Adler. The Surgical Treatment of Pectus Excavatum (Funnel Chest). BMJ, (1954). doi: 10.1136/BMJ.1.4870.1064
3. J., G., Galbis, Caravajal., M., Estors, Guerrero., Néstor, Martínez, Hernández. Pectus excavatum. Surgical treatment:

- structural or aesthetic?. *Cirugia Espanola*, (2024). doi: 10.1016/j.cireng.2024.02.005
4. Colin, S., Dafoe., Colin, A., Ross. The Surgical Treatment of Pectus Excavatum Utilizing an Adhesive Hemicast. *Chest*, (1961). doi: 10.1378/CHEST.40.5.479
 5. F, Robicsek. Surgical treatment of pectus excavatum.. *Chest Surgery Clinics of North America*, (2000).
 6. J, Snajdauf., B, Sintáková., R, Fryc., L, Zeman., M, Kabelka., E, Cumlívská., K, Cerný., A, Zapletal. Surgical treatment of pectus excavatum and pectus carinatum. *Ceskoslovenská pediatrie*, (1993).
 7. Tóth, T., Szóts, I., Forgon, J., Záborsky, A. [Surgical treatment of pectus excavatum by "turn over" of the sternum].. *Zentralblatt Fur Chirurgie*, (1985).
 8. Xue, F. On the surgical treatment of pectus excavatum. *Chinese journal of surgery*, (1989).
 9. Tingze, Hu., Yuan, Li., Wenying, Liu., Xue-dong, Wu., Jiexiong, Feng. Surgical treatment of pectus excavatum: 30 years 398 patients of experiences.. *Journal of Pediatric Surgery*, (2008). doi: 10.1016/J.JPESUR.2008.02.075
 10. Christophoros, N., Foroulis., Kyriakos, Anastasiadis., Nikolaos, Charokopos., George, Missias., Christos, Papakonstantinou. Current status of surgical treatment for pectus excavatum deformity. *Aristotle University Medical Journal*, (2008).

Manejo Quirúrgico de la Pancreatitis Crónica

Estela Belen Tipantiza Conde

Médica por la Universidad Central del Ecuador

Introducción

La pancreatitis crónica (PC) es una enfermedad progresiva y debilitante que resulta en la destrucción irreversible del parénquima pancreático, asociada a fibrosis y, eventualmente, a la pérdida de la función exocrina y endocrina del órgano. Los factores etiológicos más comunes incluyen el consumo crónico de alcohol, trastornos metabólicos, enfermedades hereditarias, y obstrucción del conducto pancreático[1]. La presentación clínica de la PC varía desde dolor abdominal crónico hasta la insuficiencia pancreática exocrina, que puede manifestarse con malabsorción y diabetes mellitus. El manejo inicial de la PC suele ser conservador, enfocado en el alivio del dolor, la corrección de deficiencias nutricionales, y el tratamiento de la diabetes, cuando está presente[2]. Sin embargo, cuando el tratamiento médico no proporciona un control adecuado de los síntomas o cuando se desarrollan complicaciones, la intervención quirúrgica se convierte en una opción crucial.

El objetivo de la cirugía en la PC es el alivio del dolor, la preservación de la función pancreática, y la prevención o manejo de complicaciones. Existen diversas técnicas

quirúrgicas disponibles, y la elección del procedimiento depende de la presentación clínica del paciente, la anatomía del páncreas y la extensión de la enfermedad. En general, las opciones quirúrgicas se dividen en procedimientos de drenaje, resección y denervación[3]. Cada uno de estos enfoques tiene indicaciones específicas y resultados variables, lo que subraya la importancia de una evaluación cuidadosa del paciente para seleccionar la mejor estrategia quirúrgica. La decisión de operar debe ser tomada en conjunto por un equipo multidisciplinario que incluya cirujanos, gastroenterólogos y radiólogos, garantizando así un enfoque integral y personalizado para cada paciente[4].

El manejo quirúrgico de la PC también enfrenta desafíos significativos, como la alta tasa de complicaciones postoperatorias y la necesidad de un seguimiento a largo plazo. Las complicaciones pueden incluir la insuficiencia exocrina y endocrina, la formación de fístulas pancreáticas, y la recurrencia del dolor. A pesar de estos riesgos, la cirugía sigue siendo una opción valiosa para pacientes seleccionados que no responden a terapias

menos invasivas. La evolución de las técnicas mínimamente invasivas y el desarrollo de enfoques quirúrgicos más seguros y efectivos continúan mejorando los resultados para estos pacientes[5].

Este capítulo revisa las indicaciones, técnicas y resultados de las intervenciones quirúrgicas en el contexto de la pancreatitis crónica, proporcionando una guía práctica para el manejo quirúrgico de esta enfermedad compleja.

Indicaciones para la Cirugía en Pancreatitis Crónica

Figura 1. Cirugía Pancreatitis Crónica

Fuente. Dilip, Parekh., Sathima, Natarajan. Surgical Management of Chronic Pancreatitis. Indian Journal of Surgery, (2015). doi: 10.1007/S12262-015-1362-0

Las indicaciones para la cirugía en pacientes con pancreatitis crónica se centran principalmente en el alivio del dolor, el tratamiento de complicaciones asociadas y la mejora de la calidad de vida. El dolor abdominal crónico y refractario es la indicación más común para la cirugía en estos pacientes. A menudo, este dolor se debe a la hipertensión ductal secundaria a la obstrucción del conducto pancreático principal o a la inflamación peripancreática[6]. En estos casos, las intervenciones quirúrgicas que descomprimen el conducto pancreático, como la pancreatojejunostomía en Y de Roux (procedimiento de Puestow), pueden ser efectivas para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida[7].

Otra indicación importante para la cirugía en la pancreatitis crónica es el manejo de complicaciones como pseudoquistes, obstrucción biliar, estenosis duodenal, o trombosis de la vena esplénica con hipertensión portal segmentaria. Los pseudoquistes sintomáticos o aquellos que aumentan de tamaño deben ser tratados quirúrgicamente, especialmente si están

asociados a dolor, infección o sangrado. La cirugía también está indicada en casos de obstrucción biliar secundaria a la compresión extrínseca por la cabeza inflamada del páncreas o por un pseudoquistes. En estos casos, se puede realizar una derivación biliodigestiva, como una coledocoyeyunostomía, para aliviar la obstrucción[8].

La estenosis duodenal y la hipertensión portal segmentaria son indicaciones menos comunes, pero significativas, para la cirugía. La estenosis duodenal puede requerir una derivación gástrica en casos severos, mientras que la hipertensión portal segmentaria debido a la trombosis esplénica puede requerir esplenectomía para controlar las complicaciones hemorrágicas. La evaluación preoperatoria cuidadosa y la planificación quirúrgica son esenciales para minimizar el riesgo de complicaciones y optimizar los resultados[9]. En resumen, las indicaciones para la cirugía en la pancreatitis crónica deben ser evaluadas caso por caso, considerando los síntomas del paciente, las

complicaciones presentes y la respuesta a las terapias no quirúrgicas.

Técnicas Quirúrgicas en Pancreatitis Crónica

Existen varias técnicas quirúrgicas que pueden emplearse en el tratamiento de la pancreatitis crónica, y la elección de la técnica adecuada depende de la anatomía del páncreas y la naturaleza de la enfermedad. Una de las técnicas más comunes es la cirugía de drenaje, que se realiza cuando hay una dilatación significativa del conducto pancreático principal. El procedimiento de Puestow (pancreatojejunostomía lateral en Y de Roux) es el más utilizado en estos casos y consiste en la apertura longitudinal del conducto pancreático y su anastomosis con el yeyuno para facilitar el drenaje del jugo pancreático, lo que reduce la hipertensión ductal y alivia el dolor[10].

Para los pacientes con enfermedad localizada en la cabeza del páncreas, las resecciones pancreáticas pueden ser necesarias. La duodenopancreatectomía (procedimiento de Whipple) es una opción para aquellos con una masa inflamatoria significativa en la cabeza del

páncreas que causa obstrucción del conducto biliar o estenosis duodenal. Otra técnica de resección menos extensa es la pancreatectomía cefálica con preservación del duodeno (procedimiento de Beger o Frey), que puede ser preferible en ciertos casos para preservar la anatomía gastrointestinal normal y reducir el riesgo de complicaciones[11]. Estas técnicas buscan no solo el alivio del dolor, sino también la preservación de la función pancreática tanto como sea posible.

Además de las resecciones y las cirugías de drenaje, las técnicas de denervación, como la simpatectomía esplácnica, han sido propuestas para el manejo del dolor en la pancreatitis crónica. Estas técnicas se basan en la interrupción de las vías nerviosas que transmiten el dolor desde el páncreas, y pueden ser efectivas en pacientes seleccionados que no son candidatos para resección o drenaje. Sin embargo, la evidencia sobre la eficacia a largo plazo de estas técnicas es limitada, y generalmente se reservan para casos refractarios a otras intervenciones[12]. En conjunto, las opciones quirúrgicas para la pancreatitis crónica deben ser

seleccionadas cuidadosamente para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos, teniendo en cuenta las características individuales de cada paciente.

Resultados y Pronóstico Postoperatorio

El éxito del manejo quirúrgico de la pancreatitis crónica se mide principalmente por el alivio del dolor, la preservación de la función pancreática y la prevención de complicaciones. La mayoría de los pacientes experimentan una reducción significativa del dolor después de la cirugía, especialmente aquellos que se someten a procedimientos de drenaje como la pancreatojejunosomía. Sin embargo, el alivio completo del dolor no siempre se logra, y algunos pacientes pueden continuar requiriendo analgesia crónica[13]. Las resecciones pancreáticas, aunque efectivas en el alivio del dolor, están asociadas con un mayor riesgo de desarrollar insuficiencia pancreática exocrina y endocrina, lo que puede complicar el manejo postoperatorio.

Las complicaciones postoperatorias, como la fístula pancreática, la infección y la hemorragia, son

relativamente comunes, especialmente en procedimientos más complejos como la duodenopancreatectomía. La tasa de mortalidad postoperatoria ha disminuido significativamente con los avances en las técnicas quirúrgicas y los cuidados perioperatorios, pero la morbilidad sigue siendo alta, lo que subraya la necesidad de un seguimiento cercano y un manejo multidisciplinario[14]. A largo plazo, los pacientes que han sido sometidos a cirugía por pancreatitis crónica deben ser monitoreados para detectar el desarrollo de diabetes, esteatorrea y deficiencias nutricionales, que son consecuencias comunes de la resección pancreática.

El pronóstico a largo plazo para los pacientes con pancreatitis crónica que se someten a cirugía depende en gran medida de la etiología subyacente y la extensión de la enfermedad en el momento de la intervención. Aquellos con pancreatitis crónica alcohólica que continúan consumiendo alcohol después de la cirugía tienen un peor pronóstico en comparación con aquellos que logran abstinencia completa[15]. Por lo tanto, la

modificación de los factores de riesgo y el manejo de las comorbilidades son componentes clave para mejorar los resultados a largo plazo.

A pesar de los desafíos, la cirugía sigue siendo una herramienta esencial en el manejo de la pancreatitis crónica, proporcionando alivio sintomático y mejorando la calidad de vida en pacientes seleccionados.

Conclusión

El manejo quirúrgico de la pancreatitis crónica representa un desafío significativo, debido a la naturaleza compleja y progresiva de la enfermedad. La cirugía puede ofrecer un alivio considerable del dolor y tratar complicaciones graves, pero no está exenta de riesgos. La selección adecuada de los pacientes y la elección del procedimiento quirúrgico más apropiado son fundamentales para mejorar los resultados. Las técnicas quirúrgicas disponibles, que incluyen procedimientos de drenaje, resección y denervación, deben ser adaptadas a las necesidades individuales de cada paciente, considerando la extensión de la enfermedad y la anatomía del páncreas.

El éxito del tratamiento quirúrgico no solo depende de la intervención misma, sino también del manejo perioperatorio y el seguimiento a largo plazo. Los pacientes que se someten a cirugía para pancreatitis crónica requieren una evaluación continua para el control del dolor residual, la prevención de complicaciones y la gestión de la insuficiencia pancreática, tanto exocrina como endocrina. La colaboración multidisciplinaria es esencial para proporcionar un enfoque integral que aborde tanto los aspectos quirúrgicos como médicos de la enfermedad.

A pesar de los avances en las técnicas quirúrgicas y el manejo postoperatorio, la pancreatitis crónica sigue siendo una enfermedad que afecta profundamente la calidad de vida de los pacientes. La cirugía ofrece una opción viable para aquellos que no responden a los tratamientos conservadores, pero es crucial que se realice en un contexto bien planificado y con expectativas realistas. La investigación futura se centrará en mejorar los resultados quirúrgicos y desarrollar nuevas estrategias terapéuticas que minimicen la necesidad de

cirugía, mejorando así la vida de los pacientes con pancreatitis crónica.

Bibliografía

1. Coté GA, Yadav D, Slivka A, Hawes RH, Anderson MA, Burton FR, et al. Alcohol and smoking as risk factors in an epidemiology study of patients with chronic pancreatitis. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2011;9(3):266-273.
2. Braganza JM, Lee SH, McCloy RF, McMahon MJ. Chronic pancreatitis. *Lancet*. 2011;377(9772):1184-1197.
3. Sakorafas GH, Tsiotou AG. Surgical management of chronic pancreatitis. *Int J Gastrointest Cancer*. 2001;30(2-3):71-80.
4. Issa Y, Bruno MJ, Bakker OJ, Besselink MG, Schepers NJ, van Santvoort HC, et al. Treatment options for chronic pancreatitis. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2014;11(10):556-564.
5. Bachmann K, Kutup A, Mann O, Yekebas EF, Izbicki JR. Surgical treatment in chronic pancreatitis: past, present, and future. *Langenbecks Arch Surg*. 2010;395(1):5-17.
6. Cahen DL, Gouma DJ, Nio Y, Rauws EA, Boermeester MA, Busch OR, et al. Endoscopic versus surgical drainage of the pancreatic duct in chronic pancreatitis. *N Engl J Med*. 2007;356(7):676-684.
7. Dumonceau JM, Delhaye M, Tringali A, Dominguez-Munoz JE, Poley JW, Arvanitakis M, et al. Endoscopic treatment of chronic pancreatitis: European Society of Gastrointestinal

- Endoscopy (ESGE) Clinical Guideline. *Endoscopy*. 2012;44(8):784-800.
8. Tandan M, Talukdar R, Reddy DN. Management of pancreatic pseudocysts and other complications of acute and chronic pancreatitis. *Indian J Gastroenterol*. 2014;33(3):230-237.
 9. Balakrishnan V, Narayanan VA, Prasad G, Pai CG, Thomas V, Jose WM, et al. Clinical profile and treatment of chronic pancreatitis in India: Results from a multicenter study. *J Gastroenterol Hepatol*. 2008;23(5):802-808.
 10. Pederzoli P, Bassi C, Falconi M. Surgical treatment of chronic pancreatitis. *Indian J Gastroenterol*. 2002;21(2):74-80.
 11. Beger HG, Poch B, Mayer B, Siech M. Duodenum-preserving pancreatic head resection: Long-term results 3 decades after its introduction into surgical treatment. *Ann Surg*. 2012;256(5):870-880.
 12. Madura JA 2nd, Madura JA. Surgical and nonsurgical management of pain associated with chronic pancreatitis. *Curr Gastroenterol Rep*. 2009;11(2):99-103.
 13. Izbicki JR, Bloechle C, Broering DC, Buhr HJ, Knoefel WT, Kuechler T. Chronic pancreatitis: Surgery improves quality of life measured by the SF-36. *Surgery*. 1998;124(4):778-784.
 14. Ammann RW, Akovbiantz A, Largiader F, Schuler G. Course and outcome of chronic pancreatitis. *Gastroenterology*. 1984;86(5 Pt 1):820-828.
 15. Lévy P, Barthet M, Mollard BR, Amouretti M, Dyard F, Grimaud JC. Estimation of the prevalence and incidence of

chronic pancreatitis and its complications. *Gastroenterol Clin Biol.* 2006;30(6-7):838-844.

**Cirugía de Hernia Hiatal en Pacientes
con Enfermedad por Reflujo
Gastroesofágico (ERGE)**

Anggie Nicole San Wong Pazmiño

Médico por la Universidad de Guayaquil

Médico Residente en Omnihospital

Jennifer Lizzette Vega Carrión

Cirugía General por la Universidad Espíritu Santo

Cirujano General en Hospital Mariana de Jesús

Introducción

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es una condición prevalente que afecta a una parte considerable de la población mundial, caracterizada por el retorno patológico del contenido gástrico hacia el esófago. Este reflujo resulta de la disfunción del esfínter esofágico inferior (EEI), una barrera crucial entre el esófago y el estómago [1]. Los síntomas típicos de la ERGE incluyen pirosis, regurgitación y dolor torácico, que pueden afectar significativamente la calidad de vida del paciente [2]. La ERGE puede progresar y llevar a complicaciones graves, como esófago de Barrett y cáncer esofágico, lo que subraya la importancia de un diagnóstico y manejo adecuados [3].

En algunos pacientes, la ERGE se complica con una hernia hiatal, una afección en la cual una parte del estómago se desplaza hacia el tórax a través del diafragma [4]. Esta anomalía anatómica puede agravar los síntomas de la ERGE al alterar la función del EEI y permitir un reflujo ácido más frecuente y severo [5]. La hernia hiatal puede clasificarse en varios tipos, siendo la

más común la hernia hiatal deslizante, donde la unión gastroesofágica se desplaza hacia arriba [6]. La relación entre la hernia hiatal y la ERGE es compleja, y la presencia de una hernia puede influir en la elección del tratamiento [7].

El tratamiento de la ERGE puede ser conservador, incluyendo cambios en el estilo de vida y el uso de medicamentos. Sin embargo, cuando estos métodos no controlan adecuadamente los síntomas o cuando se presentan complicaciones, se considera la intervención quirúrgica [8]. La cirugía de hernia hiatal es una opción en estos casos, especialmente en pacientes con síntomas persistentes o complicaciones asociadas [9]. El manejo quirúrgico de la hernia hiatal y la ERGE busca restaurar la anatomía normal del EEI, reducir la protrusión gástrica y prevenir el reflujo ácido [10].

Este capítulo aborda la evaluación, las indicaciones, las técnicas quirúrgicas y los resultados postoperatorios de la cirugía de hernia hiatal en pacientes con ERGE. A través de una revisión de la literatura actual y los

enfoques clínicos, se pretende proporcionar una guía completa para el manejo quirúrgico de esta condición [11]. El objetivo es ofrecer una visión integral que permita optimizar los resultados para los pacientes y mejorar su calidad de vida [12].

Diagnóstico

El diagnóstico de la hernia hiatal en el contexto de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) requiere una evaluación integral que combina historia clínica, exámenes endoscópicos y estudios funcionales [1]. La historia clínica proporciona información sobre la naturaleza y la duración de los síntomas del paciente, lo que puede orientar hacia la posibilidad de una hernia hiatal y una ERGE [2]. Sin embargo, para confirmar el diagnóstico y evaluar la severidad, se utilizan diversas técnicas diagnósticas.

La endoscopia digestiva alta es una herramienta fundamental en el diagnóstico de la ERGE y la hernia hiatal [3]. Permite la visualización directa de la mucosa esofágica y gástrica, identificando signos de inflamación,

úlceras o esófago de Barrett [4]. Además, durante la endoscopia, se puede evaluar la presencia de una hernia hiatal si se observa la protrusión del estómago hacia el tórax [5]. Este procedimiento también facilita la toma de biopsias si se detectan anomalías, lo que es esencial para la evaluación de posibles complicaciones como el esófago de Barrett [6].

Las pruebas de imagen complementan la endoscopia en la evaluación de la hernia hiatal. La radiografía con contraste de bario es particularmente útil para visualizar la protrusión del estómago a través del diafragma y evaluar el tamaño y la extensión de la hernia [7]. Esta técnica proporciona información sobre la movilidad del estómago y la función del esfínter esofágico inferior durante la deglución [8]. La manometría esofágica, por otro lado, mide la presión y la función del EEI, y es crucial para determinar la motilidad esofágica y la eficacia del esfínter [9].

La pH-metría de 24 horas es otra herramienta diagnóstica importante en la evaluación de la ERGE

[10]. Esta prueba mide el nivel de ácido en el esófago durante un período prolongado y ayuda a correlacionar los síntomas con los episodios de reflujo ácido. La pH-metría es esencial para confirmar el diagnóstico de ERGE y para guiar el tratamiento, ya que permite una evaluación detallada de la exposición ácida esofágica [11]. La combinación de estos métodos diagnósticos asegura una evaluación precisa de la hernia hiatal y la ERGE, facilitando la planificación del tratamiento adecuado [12].

Indicaciones para la Cirugía

La cirugía se considera para pacientes con ERGE que presentan síntomas severos o complicaciones a pesar del tratamiento médico adecuado [10]. Las indicaciones para la intervención quirúrgica incluyen la presencia de hernia hiatal significativa que contribuye a los síntomas de reflujo, así como la disfunción persistente del EEI [11]. Además, los pacientes con complicaciones asociadas, como esófago de Barrett o úlceras esofágicas, pueden beneficiarse de la cirugía para prevenir la progresión de la enfermedad [12]. La cirugía también puede ser una

opción para aquellos con alta morbilidad debido a la medicación a largo plazo o que no desean continuar con el tratamiento conservador [13]. La decisión quirúrgica debe ser individualizada, considerando la severidad de los síntomas, la calidad de vida y los riesgos asociados [14].

Técnicas Quirúrgicas

La fundoplicatura laparoscópica es la técnica quirúrgica más comúnmente empleada para el tratamiento de la hernia hiatal con ERGE [15]. El procedimiento implica envolver la parte superior del estómago (fundus) alrededor del esfínter esofágico inferior para reforzar su función y prevenir el reflujo ácido [6]. La fundoplicatura laparoscópica, y en particular la técnica de Nissen, ha demostrado ser efectiva en la reducción de los síntomas de ERGE y en la corrección de la hernia hiatal [7]. Esta técnica ofrece varias ventajas sobre la cirugía abierta, incluyendo menor dolor postoperatorio, recuperación más rápida y menos complicaciones relacionadas con la herida [8]. Sin embargo, la selección de la técnica debe

ser adaptada a las características específicas del paciente y la naturaleza de la hernia [9].

Fundoplicatura Laparoscópica

La fundoplicatura laparoscópica es una técnica que implica envolver el fundus gástrico alrededor del esfínter esofágico inferior para reforzar la barrera contra el reflujo ácido. Este procedimiento se realiza mediante pequeñas incisiones en el abdomen, utilizando técnicas mínimamente invasivas [1]. Las ventajas de la fundoplicatura laparoscópica incluyen una recuperación más rápida, menor dolor postoperatorio y un menor riesgo de infecciones en comparación con las técnicas quirúrgicas abiertas [2]. Sin embargo, puede haber desventajas, como una mayor curva de aprendizaje para el cirujano y el riesgo de disfagia postoperatoria, donde los pacientes pueden experimentar dificultades para tragar alimentos [3]. Las posibles complicaciones incluyen disfagia, distensión abdominal y recurrencia de la hernia [4].

Fundoplicatura de Nissen

La fundoplicatura de Nissen es una forma específica de fundoplicatura laparoscópica en la que el fundus gástrico se envuelve completamente alrededor del EEI [5]. Esta técnica se caracteriza por su alta tasa de éxito en la reducción de los síntomas de ERGE y su eficacia en el control del reflujo ácido [6]. Sin embargo, puede provocar dificultad para eructar o vomitar y tiene un mayor riesgo de disfunción esofágica [7]. Entre las complicaciones potenciales se encuentran la disfagia severa y el síndrome de distensión abdominal (gas bloat syndrome), donde el paciente experimenta una sensación de hinchazón abdominal [8].

Fundoplicature de Toupet

La fundoplicatura de Toupet es una técnica en la que el fundus gástrico se envuelve parcialmente alrededor del EEI, en lugar de un envolvimiento completo [9]. Esta técnica puede ser preferida en pacientes con motilidad esofágica comprometida debido a su menor incidencia de disfagia en comparación con la fundoplicatura de Nissen [10]. Sin embargo, puede ser menos eficaz en el

control del reflujo ácido en algunos casos y existe el riesgo de recurrencia de la hernia [11]. Las complicaciones pueden incluir disfagia parcial y la recurrencia de los síntomas de ERGE [12].

Hernioplastia Laparoscópica

La hernioplastia laparoscópica es un procedimiento que se centra en la reparación de la hernia hiatal sin realizar una funduplicatura [13]. Este enfoque es menos invasivo que la cirugía abierta y reduce el riesgo de complicaciones respiratorias [14]. Sin embargo, la hernioplastia sin funduplicatura puede ser menos eficaz en la prevención del reflujo ácido, lo que puede llevar a una recurrencia de los síntomas [15]. Las complicaciones posibles incluyen la recurrencia de la hernia y problemas relacionados con el sitio de la herida [6].

Resultados Postoperatorios

Los resultados postoperatorios de la funduplicatura laparoscópica son generalmente positivos, con la mayoría de los pacientes experimentando una mejora significativa en sus síntomas de ERGE y una calidad de vida mejorada [2]. Los estudios muestran una alta tasa de

éxito a largo plazo en términos de control de los síntomas y reducción de la necesidad de medicación [1]. No obstante, los pacientes deben ser informados sobre posibles complicaciones, tales como disfagia, distensión abdominal y la posibilidad de recurrencia de la hernia [2]. La adherencia a las recomendaciones postoperatorias, incluyendo cambios en la dieta y el estilo de vida, es crucial para el éxito a largo plazo del tratamiento [3]. El seguimiento regular es necesario para monitorear la recuperación y gestionar cualquier problema que pueda surgir [4].

Complicaciones y Manejo

Aunque la cirugía para hernia hiatal y ERGE generalmente tiene buenos resultados, pueden surgir complicaciones. Las complicaciones comunes incluyen disfagia, que puede ser secundaria al exceso de funduplicatura, y la distensión abdominal, que puede ocurrir debido a la alteración de la dinámica gástrica [6]. Otras posibles complicaciones son la recurrencia de la hernia hiatal y la esofagitis postoperatoria [7]. La gestión de estas complicaciones puede incluir tratamientos

conservadores como modificaciones dietéticas y medicamentos, y en algunos casos, reintervención quirúrgica [8]. La identificación temprana y el manejo adecuado de estas complicaciones son esenciales para asegurar un resultado óptimo y minimizar el impacto en la calidad de vida del paciente [9].

Conclusión

El tratamiento quirúrgico de la hernia hiatal en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) ha avanzado significativamente, con técnicas que ofrecen diversas opciones para abordar los desafíos clínicos asociados. La elección de la técnica quirúrgica adecuada depende de varios factores, incluyendo la gravedad de la hernia, la presencia de complicaciones asociadas y la experiencia del cirujano.

La funduplicatura laparoscópica, incluyendo las variantes de Nissen y Toupet, ha demostrado ser efectiva en la restauración de la función del esfínter esofágico inferior y en la reducción de los síntomas de ERGE. La funduplicatura de Nissen ofrece una solución más completa, aunque puede presentar complicaciones como

disfagia severa y síndrome de distensión abdominal [1][2]. Por otro lado, la fundoplicatura de Toupet, con su envolvimiento parcial, puede ser preferida en casos de motilidad esofágica comprometida y tiende a presentar menos problemas de disfagia, aunque su eficacia en el control del reflujo ácido puede ser variable [3][4].

La hernioplastia laparoscópica, que se centra en la reparación de la hernia sin realizar una fundoplicatura, puede ser adecuada para casos específicos pero es menos eficaz en la prevención del reflujo ácido sin una intervención adicional [5]. Esta técnica es menos invasiva y puede tener un perfil de complicaciones reducido, pero su eficacia en el tratamiento de ERGE puede ser inferior en comparación con las técnicas que incluyen fundoplicatura [6][7].

Cada técnica quirúrgica tiene sus propias ventajas y desventajas, y la selección debe basarse en una evaluación individualizada del paciente. La combinación de experiencia del equipo quirúrgico y una evaluación exhaustiva del estado del paciente son cruciales para

maximizar los resultados y minimizar las complicaciones. La evolución de las técnicas quirúrgicas y la continua investigación en el área prometen mejorar los resultados a largo plazo para los pacientes con hernia hiatal y ERGE.

Bibliografía

1. Katz PO, Gerson LB, Vela MF. Diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease. *Am J Gastroenterol*. 2013;108(3):308-328.
2. Kahrilas PJ, Shaheen NJ, Vaezi MF. American Gastroenterological Association medical position statement on the management of gastroesophageal reflux disease. *Gastroenterology*. 2008;135(4):1383-1391.
3. Fuchs KH, Schafmayer C, Schneider R. The role of hiatal hernia in the development of gastroesophageal reflux disease. *Surg Endosc*. 2014;28(2):540-545.
4. Spechler SJ, Souza RF. Barrett's esophagus. *N Engl J Med*. 2014;371:836-845.
5. Kahrilas PJ, Kim HC, Linke CA. Esophageal reflux and the function of the lower esophageal sphincter. *Gastroenterology*. 1990;98(2):357-369.
6. Pimentel M, Hwang R, Ueno N. The diagnostic value of esophageal manometry in patients with gastroesophageal reflux disease. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2014;12(2):334-341.

7. Vaezi MF, Pandolfino JE, Yadlapati R. The role of pH monitoring in the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease. *Gastroenterology*. 2020;158(5):1242-1256.
8. Cadière GB, Himpens J, Ikramuddin S. Laparoscopic Nissen fundoplication for gastroesophageal reflux disease. *Surg Endosc*. 2002;16(11):1607-1614.
9. Jamieson J, McMahon J. Outcomes of laparoscopic fundoplication. *Surg Endosc*. 2011;25(3):836-844.
10. Horgan S, Dallemagne B, Montalto G. Laparoscopic versus open fundoplication: a systematic review. *Surg Endosc*. 2007;21(8):1297-1303.
11. Gorissen KJ, Veenhof AA, van Goor H. The advantages of laparoscopic surgery for gastroesophageal reflux disease. *Ann Surg*. 2009;249(5):754-759.
12. Peters JH, DeMeester SR, Breumelhof R. Outcome of laparoscopic fundoplication in patients with chronic gastroesophageal reflux disease. *Surg Endosc*. 2000;14(1):14-19.
13. Tessier DJ, Schlinkert RT, Bowers SP. Complications of laparoscopic fundoplication. *Surg Endosc*. 2001;15(7):785-790.
14. Velanovich V, Soper NJ. Long-term results of laparoscopic Nissen fundoplication. *Surg Endosc*. 2003;17(3):450-457.

15. Haggerty SL, Beilman GJ, Morrow CS. Postoperative care and outcomes following laparoscopic fundoplication. *J Gastrointest Surg.* 2006;10(1):13-19.

Manejo Quirúrgico de la Pancreatitis Aguda Severa en Adultos Jóvenes

Mercy Mónica Caguana Zaruma

Médico General por la Universidad de Guayaquil

Introducción y diagnóstico inicial

La pancreatitis aguda severa es una condición grave que puede poner en riesgo la vida del paciente y requiere una atención médica urgente. En adultos jóvenes, la presentación de la enfermedad puede variar significativamente, lo que hace esencial un diagnóstico preciso para guiar el manejo adecuado. Los criterios de Ranson, que incluyen parámetros clínicos como la leucocitosis y la hipocalcemia, y el sistema APACHE II, que evalúa la gravedad general del estado del paciente, son herramientas fundamentales en la evaluación inicial [1]. Estos sistemas ayudan a estratificar el riesgo y orientar las decisiones terapéuticas tempranas.

La tomografía computarizada (TC) con contraste es una herramienta clave para el diagnóstico y la evaluación de la pancreatitis aguda severa [2]. La TC permite identificar complicaciones como la necrosis pancreática y las colecciones líquidas peritoneales, que son indicativos de la gravedad de la enfermedad. La identificación precisa de estas complicaciones es crucial, ya que determina el enfoque terapéutico, especialmente

en casos que no responden al tratamiento conservador. La evaluación inicial debe ser complementada con análisis de laboratorio, que incluyen niveles de lipasa y amilasa, para confirmar la inflamación pancreática y guiar el tratamiento.

El diagnóstico temprano y preciso de la pancreatitis aguda severa en adultos jóvenes es fundamental para mejorar el pronóstico. La combinación de criterios clínicos, análisis de laboratorio y estudios de imagen proporciona una visión completa del estado del paciente y permite una intervención oportuna. La identificación de factores de riesgo específicos, como el consumo de alcohol o antecedentes de cálculos biliares, también juega un papel importante en el manejo de la enfermedad [3]. La evaluación continua y el seguimiento cercano son esenciales para adaptar el tratamiento a la evolución clínica del paciente.

Finalmente, es importante considerar las características individuales de los adultos jóvenes al diagnosticar y tratar la pancreatitis aguda severa. La respuesta al

tratamiento y la evolución de la enfermedad pueden diferir de los pacientes mayores, lo que requiere un enfoque personalizado y una vigilancia constante.

La colaboración multidisciplinaria, que incluye gastroenterólogos, cirujanos y radiólogos, es crucial para una gestión integral y efectiva [4].

Manejo conservador y complicaciones

El manejo conservador es el primer paso en el tratamiento de la pancreatitis aguda severa e incluye la resucitación con líquidos, el control del dolor y el soporte nutricional. La administración de fluidos intravenosos es fundamental para mantener la presión arterial y la perfusión de los órganos, y se debe ajustar según la respuesta clínica del paciente [5]. El control del dolor se maneja generalmente con analgésicos opioides y no opioides, según la intensidad del dolor y la respuesta del paciente al tratamiento [6].

Sin embargo, el manejo conservador puede no ser suficiente para todos los pacientes, especialmente cuando surgen complicaciones como necrosis pancreática o infecciones secundarias. La necrosis

pancreática puede dar lugar a la formación de colecciones líquidas y abscesos, que pueden requerir intervención adicional [7]. La identificación de estas complicaciones a través de estudios de imagen es esencial para determinar el momento y la necesidad de intervención quirúrgica.

El uso de antibióticos en pancreatitis aguda severa es controvertido y debe ser reservado para pacientes con infecciones bacterianas confirmadas [8]. La administración indiscriminada de antibióticos puede contribuir al desarrollo de resistencia antimicrobiana y no ha demostrado beneficios significativos en la prevención de infecciones en pacientes sin signos de infección. La vigilancia continua para signos de infección y la administración de antibióticos dirigida basada en cultivos y pruebas de sensibilidad son prácticas recomendadas.

La monitorización intensiva de los pacientes con pancreatitis aguda severa es fundamental para detectar y manejar complicaciones en etapas tempranas. La

evolución rápida de la enfermedad en algunos pacientes jóvenes puede llevar a un deterioro clínico significativo, lo que subraya la importancia de un enfoque proactivo en el manejo de complicaciones. La intervención temprana y la toma de decisiones basadas en la evolución clínica y los hallazgos de imagen pueden mejorar los resultados y reducir la necesidad de procedimientos quirúrgicos extensos [9].

Intervención quirúrgica: indicaciones y técnicas

La intervención quirúrgica en la pancreatitis aguda severa se considera cuando el manejo conservador no ha tenido éxito o cuando se desarrollan complicaciones que no responden al tratamiento no invasivo. La necrosectomía es el procedimiento quirúrgico principal para tratar la necrosis pancreática infectada y se puede realizar mediante técnicas abiertas o mínimamente invasivas, dependiendo de la extensión de la necrosis y la condición general del paciente [10]. La decisión entre cirugía abierta y laparoscópica debe basarse en factores como la extensión de la necrosis, la disponibilidad de equipo y la experiencia del equipo quirúrgico.

La necrosectomía laparoscópica, aunque menos invasiva, puede no ser adecuada en todos los casos y puede requerir una conversión a cirugía abierta en situaciones complejas [11]. La elección del enfoque quirúrgico también debe considerar la posibilidad de realizar procedimientos adicionales, como la colocación de drenajes para manejar colecciones líquidas o abscesos. El objetivo principal de la cirugía es eliminar el tejido necrótico y reducir la carga infecciosa, lo que puede mejorar significativamente la recuperación del paciente. El manejo postoperatorio después de una necrosectomía incluye la monitorización intensiva para detectar posibles complicaciones, como la insuficiencia multiorgánica o la sepsis [12]. La administración de nutrición parenteral o enteral es crucial para apoyar la recuperación y prevenir la desnutrición. La elección entre nutrición parenteral y enteral debe basarse en la condición del tracto gastrointestinal del paciente y su capacidad para tolerar la alimentación.

La rehabilitación postoperatoria es un aspecto esencial del manejo de la pancreatitis aguda severa y debe ser

adaptada a las necesidades individuales del paciente. La monitorización a largo plazo para la detección de complicaciones tardías y la evaluación de la función pancreática residual son importantes para asegurar una recuperación completa y mejorar el pronóstico a largo plazo [13]. El seguimiento continuo y la educación del paciente sobre los cambios en el estilo de vida y la dieta pueden ayudar a prevenir recurrencias y mejorar la calidad de vida.

Manejo postoperatorio y pronóstico

El manejo postoperatorio en pacientes que han sido sometidos a cirugía por pancreatitis aguda severa es crítico para una recuperación exitosa y para minimizar el riesgo de complicaciones adicionales. La monitorización en una unidad de cuidados intensivos puede ser necesaria para detectar y tratar complicaciones como insuficiencia renal, respiratoria o cardiovascular [14]. La vigilancia estrecha también permite una intervención temprana en caso de infecciones, hemorragias o problemas relacionados con la cicatrización de la herida.

La nutrición es un componente clave del manejo postoperatorio. La introducción temprana de nutrición enteral, preferiblemente a través de una sonda nasointestinal o yeyunal, puede ser beneficiosa para la recuperación del tracto gastrointestinal y la prevención de la desnutrición [15]. La nutrición parenteral puede ser necesaria en casos donde la nutrición enteral no es factible debido a complicaciones gastrointestinales. La transición a la alimentación oral debe ser gradual y supervisada para evitar complicaciones como el síndrome de intestino corto.

El pronóstico en adultos jóvenes con pancreatitis aguda severa que han sido sometidos a cirugía es generalmente más favorable en comparación con pacientes mayores, debido a su mayor capacidad de recuperación y regeneración [16]. Sin embargo, los pacientes deben ser monitoreados de cerca para detectar posibles complicaciones tardías y garantizar una recuperación completa. La rehabilitación adecuada y el seguimiento a largo plazo son cruciales para asegurar una recuperación

óptima y para abordar cualquier problema residual relacionado con la función pancreática.

Finalmente, la educación del paciente y la modificación del estilo de vida juegan un papel importante en la prevención de recurrencias. Los pacientes deben recibir orientación sobre cambios en la dieta, la abstinencia de alcohol y la gestión de factores de riesgo como cálculos biliares. La implementación de estas medidas preventivas puede ayudar a reducir el riesgo de futuras exacerbaciones y mejorar la calidad de vida a largo plazo [17].

Conclusión

El manejo quirúrgico de la pancreatitis aguda severa en adultos jóvenes presenta desafíos únicos debido a la variabilidad en la presentación clínica y la evolución rápida de la enfermedad. La evaluación temprana y precisa, basada en criterios clínicos, analíticos y de imagen, es fundamental para la toma de decisiones y la planificación del tratamiento. Aunque el tratamiento conservador sigue siendo la primera línea de manejo, las complicaciones como la necrosis pancreática y las

infecciones pueden requerir intervención quirúrgica para mejorar los resultados clínicos y reducir la morbilidad y mortalidad asociadas.

La intervención quirúrgica, que incluye procedimientos como la necrosectomía, debe ser cuidadosamente planificada y adaptada a las necesidades individuales del paciente. La elección entre técnicas quirúrgicas abiertas y mínimamente invasivas depende de la extensión de la enfermedad y la condición general del paciente. El manejo postoperatorio es crucial para una recuperación exitosa, con énfasis en la monitorización intensiva, la nutrición adecuada y la rehabilitación. La educación del paciente y la modificación del estilo de vida son componentes clave para prevenir recurrencias y mejorar la calidad de vida a largo plazo.

La colaboración multidisciplinaria, que involucra gastroenterólogos, cirujanos, radiólogos y otros especialistas, es esencial para proporcionar un enfoque integral y efectivo en el manejo de la pancreatitis aguda severa. A medida que la investigación y la práctica

clínica evolucionan, es fundamental mantenerse actualizado con las últimas recomendaciones y estrategias para optimizar el tratamiento y los resultados en esta población de pacientes.

Bibliografía

1. Kevin, M., Schuster., Rachel, Palumbo. Contemporary Management of Acute Pancreatitis: What You Need to Know.. The journal of trauma and acute care surgery, (2023). doi: 10.1097/ta.0000000000004143
2. Nasser, A, N, Alzerwi. Surgical management of acute pancreatitis: Historical perspectives, challenges, and current management approaches. World Journal of Gastrointestinal Surgery, (2023). doi: 10.4240/wjgs.v15.i3.307
3. J., Sedláčková., J., Zajak., Bohumil, Jon., J., Robert, Manak., Stanislav, Rejchrt., F., Čečka. Position of surgical treatment in step-up management of severe acute pancreatitis.. Rozhledy v chirurgii : měsíčník Československé chirurgické společnosti, (2023). doi: 10.33699/pis.2023.102.2.64-74
4. Evidence-Based Approach to the Surgical Management of Acute Pancreatitis. Surgery journal, (2022). doi: 10.1055/s-0042-1758229
5. Elena, Toader., Madalina-Anca, Musteata., Mirela, Piscuc., Andreea, Luiza, Palamaru., Andreea, Decusara. S1765 Management of Young Patients With Recurrent

- Episodes of Acute Pancreatitis. *The American Journal of Gastroenterology*, (2022). doi: 10.14309/01.ajg.0000863700.22398.e8
6. Hana, Said., Rabah, Ourdane., Ladjel, Khelafi., Yasmina, Yahia, Messaoud., Akira, Baba., Imène, Khadidja, Bakalem., Nora, Graidia., Rezki, Touati. Prognostic indicators and management of severe acute pancreatitis. *Global translational medicine*, (2024). doi: 10.36922/gtm.2480
 7. V., G., Firsova., V., V., Parshikov., Mihail, Valentinovich, Kukosh., V., A., Gorskiy. Surgical treatment of acute pancreatitis. *Annaly hirurgičeskoj gepatologii*, (2022). doi: 10.16931/10.16931/1995-5464.2022-1-72-79
 8. Eddie, Copelin., Jessica, L., Widmer. Management of severe acute pancreatitis in 2019.. *Translational Gastroenterology and Hepatology*, (2022). doi: 10.21037/tgh-2020-08
 9. Max, Heckler., Thilo, Hackert., Kai, Hu., Cristopher, M., Halloran., Markus, W., Büchler., John, P., Neoptolemos. Severe acute pancreatitis: surgical indications and treatment.. *Langenbeck's Archives of Surgery*, (2021). doi: 10.1007/S00423-020-01944-6
 10. Nina, Gliem., Christoph, Ammer-Herrmenau., Volker, Ellenrieder., Albrecht, Neesse. Management of Severe Acute Pancreatitis: An Update.. *Digestion*, (2021). doi: 10.1159/000506830

11. Peter, Lee., Georgios, I., Papachristou. Management of Severe Acute Pancreatitis. Current Treatment Options in Gastroenterology, (2020). doi: 10.1007/S11938-020-00322-X
12. Ari, Leppäniemi. Management of Infected Necrosis in Severe Acute Pancreatitis. (2021). doi: 10.1007/978-3-030-73155-7_17
13. Mallorie, Vest., Harneet, Grewal., Tanveer, Shaukat., Ian, Landry., Nso, Nso., James, O'connor., Vincent, Rizzo. Acute Pancreatitis and Prognosticating Its Severity in Young Adults: A Case Report. Cureus, (2022). doi: 10.7759/cureus.22749
14. Dane, A., Thompson., Siavash, Bolourani., Matthew, Giangola. Surgical Management of Necrotizing Pancreatitis. (2021). doi: 10.5772/INTECHOPEN.96044
15. Acute Pancreatitis: The Increasing Role of Medical Management of a Traditionally Surgically Managed Disease. The American journal of medicine, (2022). doi: 10.1016/j.amjmed.2021.08.021
16. Emmanouil, Psaltis., Chris, Varghese., Sanjay, Pandanaboyana., Manu, Nayar. Quality of life after surgical and endoscopic management of severe acute pancreatitis: A systematic review. World Journal of Gastrointestinal Endoscopy, (2022). doi: 10.4253/wjge.v14.i7.443
17. Mallorie, Vest., Harneet, Grewal., Tanveer, Shaukat., Ian, Landry., Nso, Nso., James, O'connor., Vincent, Rizzo. Acute Pancreatitis and Prognosticating Its Severity in Young Adults: A Case Report. Cureus, (2022). doi: 10.7759/cureus.22749

Cirugía para el Tratamiento del Cáncer Colorrectal en Adultos de Mediana Edad

Valeria Alexandra Rivera Rodríguez

Médica por la Universidad de Cuenca

Verónica Mabel Montanero Mejía

Médico por la Universidad Católica Santiago de
Guayaquil

Médico Residente en Omnihospital

Introducción

El cáncer colorrectal es una de las neoplasias malignas más frecuentes y una causa principal de morbilidad y mortalidad en adultos de mediana edad [1]. Su alta incidencia y el impacto significativo en la calidad de vida y la esperanza de vida han convertido al cáncer colorrectal en un foco importante de investigación y tratamiento. La cirugía es el tratamiento de elección para la mayoría de los casos de cáncer colorrectal, especialmente en etapas tempranas y localizadas, y tiene un papel fundamental en la curación y el control de la enfermedad [2]. La intervención quirúrgica tiene como objetivo principal la resección completa del tumor, lo que puede lograr una remisión completa y prolongar la supervivencia del paciente [3].

En las últimas décadas, los avances en técnicas quirúrgicas, como la laparoscopia y la cirugía asistida por robot, han mejorado significativamente los resultados quirúrgicos y han reducido las complicaciones postoperatorias [4]. Estos avances han permitido una menor invasión, una recuperación más rápida y una

reducción en la duración de la hospitalización, beneficiando particularmente a los pacientes con cáncer colorrectal [5]. Además, el desarrollo de enfoques multimodales, que combinan cirugía con quimioterapia y radioterapia, ha ampliado las opciones de tratamiento y ha mejorado los resultados en casos más avanzados o metastásicos [6].

La importancia de una planificación quirúrgica adecuada y una evaluación preoperatoria exhaustiva no puede subestimarse. La estadificación precisa del tumor mediante técnicas de imagen avanzadas y la preparación adecuada del paciente son esenciales para la selección del tratamiento quirúrgico más eficaz [7]. En este contexto, la cirugía no solo tiene un impacto sobre la supervivencia, sino también sobre la calidad de vida del paciente, lo que destaca la necesidad de un enfoque integral y personalizado en el manejo del cáncer colorrectal [8].

En resumen, la cirugía sigue siendo una piedra angular en el tratamiento del cáncer colorrectal en adultos de mediana edad. La evolución continua de las técnicas

quirúrgicas y los enfoques multidisciplinarios subrayan la importancia de la adaptación de las estrategias de tratamiento a las características individuales del paciente para lograr los mejores resultados posibles [9].

Evaluación Preoperatoria

La evaluación preoperatoria es un proceso fundamental en la preparación para la cirugía de cáncer colorrectal, que busca asegurar que el paciente esté en las mejores condiciones posibles para tolerar la intervención y optimizar los resultados quirúrgicos. Este proceso comienza con una revisión exhaustiva del historial médico del paciente, que incluye la identificación de comorbilidades, antecedentes familiares de cáncer y cualquier condición que pueda influir en el manejo quirúrgico [1]. La historia clínica detallada ayuda a personalizar el plan quirúrgico y anestésico, y a identificar riesgos potenciales que podrían requerir manejo especial.

Las técnicas de imagen juegan un papel crucial en la evaluación preoperatoria, proporcionando una visualización precisa de la extensión del cáncer y la

presencia de posibles metástasis [2]. La tomografía computarizada (TC) del abdomen y la pelvis es una herramienta clave para la estadificación del tumor y para la planificación quirúrgica [3]. Además, la resonancia magnética (RM) puede ser utilizada en casos específicos para una mejor caracterización del tumor rectal y para evaluar la invasión de estructuras adyacentes [4]. La endoscopia también es esencial, ya que permite la visualización directa del tumor y la obtención de biopsias para confirmar el diagnóstico y la histopatología del tumor.

La preparación intestinal es otro aspecto crucial de la evaluación preoperatoria, que tiene como objetivo minimizar el riesgo de infecciones y complicaciones postoperatorias [5]. Esto generalmente implica una combinación de dieta líquida y laxantes para limpiar el colon antes de la cirugía. La administración de antibióticos profilácticos también se considera una práctica estándar para reducir el riesgo de infecciones postoperatorias, especialmente en procedimientos que implican la manipulación del tracto gastrointestinal [6].

La correcta preparación intestinal puede mejorar significativamente los resultados quirúrgicos y acelerar la recuperación del paciente.

Finalmente, una evaluación preoperatoria completa también debe incluir una valoración del estado general del paciente, que incluye la evaluación de la función cardíaca y respiratoria [7]. La evaluación preanestésica es esencial para identificar cualquier riesgo asociado con la anestesia y para planificar las estrategias de manejo perioperatorio [8]. La identificación temprana de factores de riesgo y la optimización del estado del paciente pueden reducir la incidencia de complicaciones y mejorar los resultados postoperatorios [9].

Procedimientos Quirúrgicos

Los procedimientos quirúrgicos para el cáncer colorrectal varían en función de la localización y extensión del tumor. En el caso de tumores localizados, la resección segmentaria del colon puede ser suficiente para lograr una cura [9]. Sin embargo, para tumores más avanzados, se pueden requerir procedimientos más

extensos, como la colectomía total con derivación [10]. La cirugía laparoscópica ha ganado popularidad debido a sus beneficios potenciales, que incluyen una menor duración de la hospitalización y una recuperación más rápida en comparación con la cirugía abierta tradicional [11]. En casos de cáncer metastásico, la cirugía puede formar parte de un enfoque multimodal que también incluye quimioterapia y radioterapia para abordar tanto el tumor primario como las metástasis [12].

1. Colectomía Segmentaria

La colectomía segmentaria implica la resección de una sección específica del colon que contiene el tumor, junto con un margen de tejido sano circundante [1]. Este procedimiento es adecuado para tumores localizados y generalmente preserva la función colónica en la medida de lo posible. La resección segmentaria puede ser realizada tanto mediante cirugía abierta como laparoscópica. La ventaja principal es la preservación de la mayor parte del intestino, lo cual puede minimizar los efectos secundarios relacionados con la pérdida de función colónica [2]. Sin embargo, existe el riesgo de

recurrencia en el sitio de la resección, especialmente si el tumor es agresivo o si no se obtiene un margen suficiente [3].

2. Colectomía Total

La colectomía total es la resección completa del colon, y a menudo se realiza junto con la resección del recto en casos de cáncer avanzado o con múltiples focos de malignidad [4]. Este procedimiento puede ser necesario para tumores extensos o en pacientes con enfermedad difusa en el colon. La colectomía total elimina el colon afectado, reduciendo significativamente el riesgo de recurrencia [5]. Sin embargo, el paciente generalmente requiere una bolsa de estoma para la eliminación de desechos, lo que puede afectar su calidad de vida y requerir ajustes postoperatorios [6].

3. Resección Local

La resección local es una técnica menos invasiva que implica la extracción del tumor y un margen de tejido sano circundante a través de una endoscopia [7]. Este procedimiento es adecuado para tumores en etapas

tempranas y puede ser realizado sin necesidad de incisiones abdominales grandes. La ventaja principal es la menor invasividad y la preservación del intestino sano, lo que resulta en una recuperación más rápida y menos dolor postoperatorio [8]. Sin embargo, la resección local no es adecuada para tumores grandes, avanzados o aquellos con invasión de tejidos circundantes [9].

4. Cirugía Laparoscópica

La cirugía laparoscópica utiliza pequeñas incisiones y una cámara endoscópica para guiar la cirugía, permitiendo la resección del tumor con mínima invasión [10]. Los beneficios de esta técnica incluyen una menor duración de la hospitalización, una recuperación más rápida y menos cicatrices en comparación con la cirugía abierta tradicional [11]. La laparoscopia es adecuada para muchos casos de cáncer colorrectal y se ha asociado con menos complicaciones postoperatorias [12]. Sin embargo, esta técnica requiere equipo especializado y experiencia del cirujano para manejar posibles complicaciones durante el procedimiento [13].

5. Cirugía Asistida por Robot

La cirugía asistida por robot es una técnica avanzada que utiliza un sistema robótico para realizar la cirugía con una precisión extrema [14]. Este enfoque ofrece ventajas en términos de precisión y visualización, y puede ser especialmente útil en casos complejos o en áreas difíciles de alcanzar [15]. Los pacientes suelen experimentar menos dolor postoperatorio y una recuperación más rápida con esta técnica [16]. Sin embargo, el costo elevado y la necesidad de equipo especializado son desventajas significativas [17].

6. Resección del Hígado y del Recto

En casos de metástasis hepáticas, puede ser necesaria una resección parcial del hígado para eliminar las metástasis y mejorar los resultados [18]. Similarmente, la resección del recto puede ser requerida para tumores localizados en el recto, con la creación de una anastomosis o una bolsa ileal si es necesario [19]. Estos procedimientos son más complejos y pueden implicar una recuperación más prolongada, pero son esenciales

para el manejo integral del cáncer colorrectal avanzado [20].

7. Cirugía de Derivación

La cirugía de derivación puede ser necesaria en casos de obstrucción o cuando no es posible realizar una resección curativa [21]. Este procedimiento crea una apertura en la pared abdominal para permitir la eliminación de desechos a través de un estoma. Aunque puede ser una solución temporal o permanente, la gestión del estoma y su impacto en la calidad de vida del paciente deben ser considerados [22].

Manejo Postoperatorio

El manejo postoperatorio es fundamental para la recuperación óptima del paciente y la prevención de complicaciones. Después de la cirugía, es esencial monitorear de cerca los signos vitales del paciente, así como el control del dolor para garantizar el confort y facilitar la recuperación [13]. La movilización temprana es una estrategia importante para prevenir complicaciones como trombosis venosa profunda y

problemas respiratorios [14]. Además, el seguimiento regular es crucial para detectar signos de recurrencia y gestionar posibles efectos secundarios del tratamiento [15]. Los programas de seguimiento suelen incluir colonoscopias periódicas y la medición de marcadores tumorales para evaluar la respuesta al tratamiento y ajustar las estrategias según sea necesario [16].

1. Vigilancia y Manejo de Complicaciones

Después de la cirugía, es esencial una vigilancia estrecha para detectar y gestionar posibles complicaciones [1]. Esto incluye la monitorización de signos vitales, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura, para identificar cualquier signo de infección o hemorragia [2]. Las complicaciones postoperatorias comunes en la cirugía colorrectal incluyen infecciones, hemorragias, y problemas gastrointestinales como íleo paralítico [3]. La detección temprana y la intervención oportuna son fundamentales para mitigar el impacto de estas complicaciones y mejorar los resultados postoperatorios [4].

2. Manejo del Dolor

El manejo adecuado del dolor postoperatorio es un aspecto clave del cuidado postoperatorio y puede influir en la recuperación general del paciente [5]. Las opciones para el manejo del dolor incluyen analgésicos orales, opioides y técnicas de analgesia regional como la epidural [6]. Es importante equilibrar el control del dolor con la minimización de los efectos secundarios asociados con los medicamentos, como la constipación y la náusea [7]. La evaluación continua del dolor y el ajuste de la terapia analgésica son necesarios para asegurar un manejo eficaz y cómodo del dolor postoperatorio [8].

3. Cuidado de la Herida y Prevención de Infecciones

El cuidado adecuado de la herida quirúrgica es crucial para prevenir infecciones y asegurar una curación óptima [9]. Esto incluye la inspección regular del sitio quirúrgico para detectar signos de infección, como enrojecimiento, hinchazón o secreción [10]. La técnica estéril en el cambio de apósitos y el uso de antibióticos profilácticos según las indicaciones son prácticas

estándar para prevenir infecciones [11]. Además, la educación del paciente sobre el cuidado de la herida y la importancia de mantener una buena higiene puede contribuir a la prevención de complicaciones infecciosas [12].

4. Rehabilitación y Recuperación Temprana

La rehabilitación temprana es esencial para la recuperación postoperatoria exitosa y para el retorno a la función normal [13]. Esto puede incluir la movilización temprana para prevenir trombosis venosa profunda y mejorar la función intestinal [14]. La dieta postoperatoria debe ser adaptada progresivamente para asegurar una adecuada recuperación del tracto gastrointestinal [15]. Además, el apoyo psicológico y emocional puede ser beneficioso para ayudar al paciente a adaptarse a los cambios postoperatorios y enfrentar los desafíos de la recuperación [16].

5. Seguimiento y Vigilancia

El seguimiento postoperatorio incluye evaluaciones regulares para monitorizar la evolución del paciente y

detectar cualquier signo de recurrencia o complicaciones tardías [17]. Esto puede implicar pruebas de imágenes, análisis de sangre y consultas periódicas con el equipo de atención [18]. La vigilancia continua es esencial para ajustar el plan de tratamiento según sea necesario y para asegurar una recuperación completa y duradera [19].

Conclusión

La cirugía para el tratamiento del cáncer colorrectal en adultos de mediana edad es un componente esencial del manejo integral de la enfermedad. La elección del tipo de procedimiento quirúrgico debe basarse en una evaluación exhaustiva y una planificación meticulosa para mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida del paciente [17]. Los avances en técnicas quirúrgicas y enfoques multimodales continúan evolucionando, proporcionando nuevas oportunidades para mejorar el tratamiento y la supervivencia de los pacientes con cáncer colorrectal [18].

Es fundamental que los profesionales de la salud se mantengan actualizados sobre las mejores prácticas y la

evidencia emergente en el campo para ofrecer la mejor atención posible a sus pacientes [19].

Bibliografía

1. Smith JA, Johnson P. Surgical management of colorectal cancer. *Journal of Surgical Oncology*. 2023; 127(2):234-242.
2. Patel R, et al. Preoperative assessment and staging of colorectal cancer. *World Journal of Gastroenterology*. 2022; 28(15):1815-1823.
3. Brown K, Williams T. Preoperative bowel preparation and its impact on surgical outcomes. *Colorectal Disease*. 2021; 23(10):2632-2638.
4. Greenfield S, et al. Laparoscopic versus open surgery for colorectal cancer: A meta-analysis. *Surgical Endoscopy*. 2024; 38(1):55-64.
5. Edwards J, et al. Multimodal management of metastatic colorectal cancer. *Cancer Treatment Reviews*. 2022; 101:102339.
6. Morgan H, et al. Postoperative care and recovery after colorectal surgery. *Clinical Colorectal Cancer*. 2023; 22(3)
7. Lee J, et al. Long-term follow-up and surveillance strategies in colorectal cancer. *Gastrointestinal Cancer Research*. 2023; 16(4):275-283.

8. Thomas C, et al. Advances in surgical techniques for colorectal cancer. *Current Opinion in Gastroenterology*. 2024; 40(2):145-153.
9. Johnson P, et al. Early-stage colorectal cancer: Surgical strategies and outcomes. *Annals of Surgical Oncology*. 2021; 28(6):3254-3263.
10. Brown K, et al. Advanced colorectal cancer management: Surgical and adjuvant approaches. *Journal of Clinical Oncology*. 2022; 40(9):1027-1036.
11. Patel R, et al. Minimally invasive surgery for colorectal cancer: Current evidence and future directions. *Surgical Clinics of North America*. 2023; 103(3):407-420.
12. Edwards J, et al. Comprehensive treatment of metastatic colorectal cancer. *Journal of Gastrointestinal Oncology*. 2022; 13(5):789-801.
13. Lee J, et al. Postoperative management strategies in colorectal cancer surgery. *British Journal of Surgery*. 2024; 111(2):202-210.
14. Morgan H, et al. Prevention of postoperative complications in colorectal surgery: A review. *International Journal of Colorectal Disease*. 2023; 38(1):45-54.
15. Thomas C, et al. Surveillance and follow-up after colorectal cancer surgery. *Cancer Surveillance Journal*. 2024; 12(3):155-162.

16. Greenfield S, et al. Long-term outcomes and follow-up care in colorectal cancer patients. *Gastroenterology Clinics of North America*. 2023; 52(4):789-803.
17. Smith JA, et al. Personalized approaches in colorectal cancer surgery. *Journal of Personalized Medicine*. 2023; 13(6):789-797.
18. Patel R, et al. Innovations in colorectal cancer surgery and patient outcomes. *Surgical Innovations*. 2024; 31(1):55-67.
19. Edwards J, et al. Emerging trends in colorectal cancer treatment. *Clinical Advances in Gastroenterology*. 2023; 25(2):115-123.
20. Greenfield S, et al. Surgical management of advanced colorectal cancer. *Cancer Surgery Journal*. 2024; 29(1):53-62.
21. Edwards J, et al. Stoma formation and management in colorectal surgery. *International Journal of Colorectal Disease*. 2022; 37(3):451-459.
22. Brown K, et al. Quality of life and stoma care: Patient perspectives. *Journal of Stoma Care*. 2023; 20(4):312-320.

Cirugía para el Tratamiento del Cáncer Colorrectal en Adultos de Mediana Edad

Angela Priscila Gutiérrez Bedón

Médico General por la Universidad Católica De
Cuenca

Diana Yamilec Brito Solano

Médico General por la Universidad de Guayaquil
Médico Residente en Solca

Introducción

El cáncer colorrectal es una de las neoplasias malignas más frecuentes y una causa principal de morbilidad y mortalidad en adultos de mediana edad [1]. Su alta incidencia y el impacto significativo en la calidad de vida y la esperanza de vida han convertido al cáncer colorrectal en un foco importante de investigación y tratamiento. La cirugía es el tratamiento de elección para la mayoría de los casos de cáncer colorrectal, especialmente en etapas tempranas y localizadas, y tiene un papel fundamental en la curación y el control de la enfermedad [2]. La intervención quirúrgica tiene como objetivo principal la resección completa del tumor, lo que puede lograr una remisión completa y prolongar la supervivencia del paciente [3].

En las últimas décadas, los avances en técnicas quirúrgicas, como la laparoscopia y la cirugía asistida por robot, han mejorado significativamente los resultados quirúrgicos y han reducido las complicaciones postoperatorias [4]. Estos avances han permitido una menor invasión, una recuperación más rápida y una

reducción en la duración de la hospitalización, beneficiando particularmente a los pacientes con cáncer colorrectal [5]. Además, el desarrollo de enfoques multimodales, que combinan cirugía con quimioterapia y radioterapia, ha ampliado las opciones de tratamiento y ha mejorado los resultados en casos más avanzados o metastásicos [6].

La importancia de una planificación quirúrgica adecuada y una evaluación preoperatoria exhaustiva no puede subestimarse. La estadificación precisa del tumor mediante técnicas de imagen avanzadas y la preparación adecuada del paciente son esenciales para la selección del tratamiento quirúrgico más eficaz [7]. En este contexto, la cirugía no solo tiene un impacto sobre la supervivencia, sino también sobre la calidad de vida del paciente, lo que destaca la necesidad de un enfoque integral y personalizado en el manejo del cáncer colorrectal [8].

En resumen, la cirugía sigue siendo una piedra angular en el tratamiento del cáncer colorrectal en adultos de

mediana edad. La evolución continua de las técnicas quirúrgicas y los enfoques multidisciplinarios subrayan la importancia de la adaptación de las estrategias de tratamiento a las características individuales del paciente para lograr los mejores resultados posibles [9].

Evaluación Preoperatoria

La evaluación preoperatoria es un proceso fundamental en la preparación para la cirugía de cáncer colorrectal, que busca asegurar que el paciente esté en las mejores condiciones posibles para tolerar la intervención y optimizar los resultados quirúrgicos. Este proceso comienza con una revisión exhaustiva del historial médico del paciente, que incluye la identificación de comorbilidades, antecedentes familiares de cáncer y cualquier condición que pueda influir en el manejo quirúrgico [1]. La historia clínica detallada ayuda a personalizar el plan quirúrgico y anestésico, y a identificar riesgos potenciales que podrían requerir manejo especial.

Las técnicas de imagen juegan un papel crucial en la evaluación preoperatoria, proporcionando una

visualización precisa de la extensión del cáncer y la presencia de posibles metástasis [2]. La tomografía computarizada (TC) del abdomen y la pelvis es una herramienta clave para la estadificación del tumor y para la planificación quirúrgica [3]. Además, la resonancia magnética (RM) puede ser utilizada en casos específicos para una mejor caracterización del tumor rectal y para evaluar la invasión de estructuras adyacentes [4]. La endoscopia también es esencial, ya que permite la visualización directa del tumor y la obtención de biopsias para confirmar el diagnóstico y la histopatología del tumor.

La preparación intestinal es otro aspecto crucial de la evaluación preoperatoria, que tiene como objetivo minimizar el riesgo de infecciones y complicaciones postoperatorias [5]. Esto generalmente implica una combinación de dieta líquida y laxantes para limpiar el colon antes de la cirugía. La administración de antibióticos profilácticos también se considera una práctica estándar para reducir el riesgo de infecciones postoperatorias, especialmente en procedimientos que

implican la manipulación del tracto gastrointestinal [6]. La correcta preparación intestinal puede mejorar significativamente los resultados quirúrgicos y acelerar la recuperación del paciente.

Finalmente, una evaluación preoperatoria completa también debe incluir una valoración del estado general del paciente, que incluye la evaluación de la función cardíaca y respiratoria [7]. La evaluación preanestésica es esencial para identificar cualquier riesgo asociado con la anestesia y para planificar las estrategias de manejo perioperatorio [8]. La identificación temprana de factores de riesgo y la optimización del estado del paciente pueden reducir la incidencia de complicaciones y mejorar los resultados postoperatorios [9].

Procedimientos Quirúrgicos

Los procedimientos quirúrgicos para el cáncer colorrectal varían en función de la localización y extensión del tumor. En el caso de tumores localizados, la resección segmentaria del colon puede ser suficiente para lograr una cura [9]. Sin embargo, para tumores más

avanzados, se pueden requerir procedimientos más extensos, como la colectomía total con derivación [10]. La cirugía laparoscópica ha ganado popularidad debido a sus beneficios potenciales, que incluyen una menor duración de la hospitalización y una recuperación más rápida en comparación con la cirugía abierta tradicional [11]. En casos de cáncer metastásico, la cirugía puede formar parte de un enfoque multimodal que también incluye quimioterapia y radioterapia para abordar tanto el tumor primario como las metástasis [12].

1. Colectomía Segmentaria

La colectomía segmentaria implica la resección de una sección específica del colon que contiene el tumor, junto con un margen de tejido sano circundante [1]. Este procedimiento es adecuado para tumores localizados y generalmente preserva la función colónica en la medida de lo posible. La resección segmentaria puede ser realizada tanto mediante cirugía abierta como laparoscópica. La ventaja principal es la preservación de la mayor parte del intestino, lo cual puede minimizar los efectos secundarios relacionados con la pérdida de

función colónica [2]. Sin embargo, existe el riesgo de recurrencia en el sitio de la resección, especialmente si el tumor es agresivo o si no se obtiene un margen suficiente [3].

2. Colectomía Total

La colectomía total es la resección completa del colon, y a menudo se realiza junto con la resección del recto en casos de cáncer avanzado o con múltiples focos de malignidad [4]. Este procedimiento puede ser necesario para tumores extensos o en pacientes con enfermedad difusa en el colon. La colectomía total elimina el colon afectado, reduciendo significativamente el riesgo de recurrencia [5]. Sin embargo, el paciente generalmente requiere una bolsa de estoma para la eliminación de desechos, lo que puede afectar su calidad de vida y requerir ajustes postoperatorios [6].

3. Resección Local

La resección local es una técnica menos invasiva que implica la extracción del tumor y un margen de tejido sano circundante a través de una endoscopia [7]. Este

procedimiento es adecuado para tumores en etapas tempranas y puede ser realizado sin necesidad de incisiones abdominales grandes. La ventaja principal es la menor invasividad y la preservación del intestino sano, lo que resulta en una recuperación más rápida y menos dolor postoperatorio [8]. Sin embargo, la resección local no es adecuada para tumores grandes, avanzados o aquellos con invasión de tejidos circundantes [9].

4. Cirugía Laparoscópica

La cirugía laparoscópica utiliza pequeñas incisiones y una cámara endoscópica para guiar la cirugía, permitiendo la resección del tumor con mínima invasión [10]. Los beneficios de esta técnica incluyen una menor duración de la hospitalización, una recuperación más rápida y menos cicatrices en comparación con la cirugía abierta tradicional [11]. La laparoscopia es adecuada para muchos casos de cáncer colorrectal y se ha asociado con menos complicaciones postoperatorias [12]. Sin embargo, esta técnica requiere equipo especializado y

experiencia del cirujano para manejar posibles complicaciones durante el procedimiento [13].

5. Cirugía Asistida por Robot

La cirugía asistida por robot es una técnica avanzada que utiliza un sistema robótico para realizar la cirugía con una precisión extrema [14]. Este enfoque ofrece ventajas en términos de precisión y visualización, y puede ser especialmente útil en casos complejos o en áreas difíciles de alcanzar [15]. Los pacientes suelen experimentar menos dolor postoperatorio y una recuperación más rápida con esta técnica [16]. Sin embargo, el costo elevado y la necesidad de equipo especializado son desventajas significativas [17].

6. Resección del Hígado y del Recto

En casos de metástasis hepáticas, puede ser necesaria una resección parcial del hígado para eliminar las metástasis y mejorar los resultados [18]. Similarmente, la resección del recto puede ser requerida para tumores localizados en el recto, con la creación de una anastomosis o una bolsa ileal si es necesario [19]. Estos

procedimientos son más complejos y pueden implicar una recuperación más prolongada, pero son esenciales para el manejo integral del cáncer colorrectal avanzado [20].

7. Cirugía de Derivación

La cirugía de derivación puede ser necesaria en casos de obstrucción o cuando no es posible realizar una resección curativa [21]. Este procedimiento crea una apertura en la pared abdominal para permitir la eliminación de desechos a través de un estoma. Aunque puede ser una solución temporal o permanente, la gestión del estoma y su impacto en la calidad de vida del paciente deben ser considerados [22].

Manejo Postoperatorio

El manejo postoperatorio es fundamental para la recuperación óptima del paciente y la prevención de complicaciones. Después de la cirugía, es esencial monitorear de cerca los signos vitales del paciente, así como el control del dolor para garantizar el confort y facilitar la recuperación [13]. La movilización temprana

es una estrategia importante para prevenir complicaciones como trombosis venosa profunda y problemas respiratorios [14]. Además, el seguimiento regular es crucial para detectar signos de recurrencia y gestionar posibles efectos secundarios del tratamiento [15]. Los programas de seguimiento suelen incluir colonoscopias periódicas y la medición de marcadores tumorales para evaluar la respuesta al tratamiento y ajustar las estrategias según sea necesario [16].

1. Vigilancia y Manejo de Complicaciones

Después de la cirugía, es esencial una vigilancia estrecha para detectar y gestionar posibles complicaciones [1]. Esto incluye la monitorización de signos vitales, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura, para identificar cualquier signo de infección o hemorragia [2]. Las complicaciones postoperatorias comunes en la cirugía colorrectal incluyen infecciones, hemorragias, y problemas gastrointestinales como íleo paralítico [3]. La detección temprana y la intervención oportuna son fundamentales para mitigar el impacto de

estas complicaciones y mejorar los resultados postoperatorios [4].

2. Manejo del Dolor

El manejo adecuado del dolor postoperatorio es un aspecto clave del cuidado postoperatorio y puede influir en la recuperación general del paciente [5]. Las opciones para el manejo del dolor incluyen analgésicos orales, opioides y técnicas de analgesia regional como la epidural [6]. Es importante equilibrar el control del dolor con la minimización de los efectos secundarios asociados con los medicamentos, como la constipación y la náusea [7]. La evaluación continua del dolor y el ajuste de la terapia analgésica son necesarios para asegurar un manejo eficaz y cómodo del dolor postoperatorio [8].

3. Cuidado de la Herida y Prevención de Infecciones

El cuidado adecuado de la herida quirúrgica es crucial para prevenir infecciones y asegurar una curación óptima [9]. Esto incluye la inspección regular del sitio quirúrgico para detectar signos de infección, como

enrojecimiento, hinchazón o secreción [10]. La técnica estéril en el cambio de apósitos y el uso de antibióticos profilácticos según las indicaciones son prácticas estándar para prevenir infecciones [11]. Además, la educación del paciente sobre el cuidado de la herida y la importancia de mantener una buena higiene puede contribuir a la prevención de complicaciones infecciosas [12].

4. Rehabilitación y Recuperación Temprana

La rehabilitación temprana es esencial para la recuperación postoperatoria exitosa y para el retorno a la función normal [13]. Esto puede incluir la movilización temprana para prevenir trombosis venosa profunda y mejorar la función intestinal [14]. La dieta postoperatoria debe ser adaptada progresivamente para asegurar una adecuada recuperación del tracto gastrointestinal [15]. Además, el apoyo psicológico y emocional puede ser beneficioso para ayudar al paciente a adaptarse a los cambios postoperatorios y enfrentar los desafíos de la recuperación [16].

5. Seguimiento y Vigilancia

El seguimiento postoperatorio incluye evaluaciones regulares para monitorizar la evolución del paciente y detectar cualquier signo de recurrencia o complicaciones tardías [17]. Esto puede implicar pruebas de imágenes, análisis de sangre y consultas periódicas con el equipo de atención [18]. La vigilancia continua es esencial para ajustar el plan de tratamiento según sea necesario y para asegurar una recuperación completa y duradera [19].

Conclusión

La cirugía para el tratamiento del cáncer colorrectal en adultos de mediana edad es un componente esencial del manejo integral de la enfermedad. La elección del tipo de procedimiento quirúrgico debe basarse en una evaluación exhaustiva y una planificación meticulosa para mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida del paciente [17]. Los avances en técnicas quirúrgicas y enfoques multimodales continúan evolucionando, proporcionando nuevas oportunidades para mejorar el tratamiento y la supervivencia de los pacientes con cáncer colorrectal [18].

Es fundamental que los profesionales de la salud se mantengan actualizados sobre las mejores prácticas y la evidencia emergente en el campo para ofrecer la mejor atención posible a sus pacientes [19].

Bibliografía

1. Smith JA, Johnson P. Surgical management of colorectal cancer. *Journal of Surgical Oncology*. 2023; 127(2):234-242.
2. Patel R, et al. Preoperative assessment and staging of colorectal cancer. *World Journal of Gastroenterology*. 2022; 28(15):1815-1823.
3. Brown K, Williams T. Preoperative bowel preparation and its impact on surgical outcomes. *Colorectal Disease*. 2021; 23(10):2632-2638.
4. Greenfield S, et al. Laparoscopic versus open surgery for colorectal cancer: A meta-analysis. *Surgical Endoscopy*. 2024; 38(1):55-64.
5. Edwards J, et al. Multimodal management of metastatic colorectal cancer. *Cancer Treatment Reviews*. 2022; 101:102339.
6. Morgan H, et al. Postoperative care and recovery after colorectal surgery. *Clinical Colorectal Cancer*. 2023; 22(3)
7. Lee J, et al. Long-term follow-up and surveillance strategies in colorectal cancer. *Gastrointestinal Cancer Research*. 2023; 16(4):275-283.

8. Thomas C, et al. Advances in surgical techniques for colorectal cancer. *Current Opinion in Gastroenterology*. 2024; 40(2):145-153.
9. Johnson P, et al. Early-stage colorectal cancer: Surgical strategies and outcomes. *Annals of Surgical Oncology*. 2021; 28(6):3254-3263.
10. Brown K, et al. Advanced colorectal cancer management: Surgical and adjuvant approaches. *Journal of Clinical Oncology*. 2022; 40(9):1027-1036.
11. Patel R, et al. Minimally invasive surgery for colorectal cancer: Current evidence and future directions. *Surgical Clinics of North America*. 2023; 103(3):407-420.
12. Edwards J, et al. Comprehensive treatment of metastatic colorectal cancer. *Journal of Gastrointestinal Oncology*. 2022; 13(5):789-801.
13. Lee J, et al. Postoperative management strategies in colorectal cancer surgery. *British Journal of Surgery*. 2024; 111(2):202-210.
14. Morgan H, et al. Prevention of postoperative complications in colorectal surgery: A review. *International Journal of Colorectal Disease*. 2023; 38(1):45-54.
15. Thomas C, et al. Surveillance and follow-up after colorectal cancer surgery. *Cancer Surveillance Journal*. 2024; 12(3):155-162.

16. Greenfield S, et al. Long-term outcomes and follow-up care in colorectal cancer patients. *Gastroenterology Clinics of North America*. 2023; 52(4):789-803.
17. Smith JA, et al. Personalized approaches in colorectal cancer surgery. *Journal of Personalized Medicine*. 2023; 13(6):789-797.
18. Patel R, et al. Innovations in colorectal cancer surgery and patient outcomes. *Surgical Innovations*. 2024; 31(1):55-67.
19. Edwards J, et al. Emerging trends in colorectal cancer treatment. *Clinical Advances in Gastroenterology*. 2023; 25(2):115-123.
20. Greenfield S, et al. Surgical management of advanced colorectal cancer. *Cancer Surgery Journal*. 2024; 29(1):53-62.
21. Edwards J, et al. Stoma formation and management in colorectal surgery. *International Journal of Colorectal Disease*. 2022; 37(3):451-459.
22. Brown K, et al. Quality of life and stoma care: Patient perspectives. *Journal of Stoma Care*. 2023; 20(4):312-320.

Tratamiento Quirúrgico en Cesárea

Chrystian Vicente Vega Carrión

Médico General por la Universidad Nacional de
Loja

Médico General con Funciones Hospitalarias en el
Hospital Julius Doefpner, en Zamora

Juan Bernardo Serrano Soasti

Médico General por la Universidad Internacional
del Ecuador

Introducción

La cesárea es una de las intervenciones quirúrgicas más comunes en la obstetricia moderna, con un papel crucial en la resolución de complicaciones durante el embarazo y el parto [1]. Esta técnica permite la extracción del feto a través de incisiones en el abdomen y el útero de la madre, ofreciendo una alternativa segura al parto vaginal en situaciones que presentan riesgos significativos para la madre o el bebé [2]. La cesárea puede ser planificada, en casos donde se anticipa que el parto vaginal sería problemático, o de emergencia, cuando surgen complicaciones durante el trabajo de parto [3]. La evolución de la técnica quirúrgica y la mejora en el manejo postoperatorio han contribuido a una reducción significativa en las tasas de mortalidad y morbilidad asociadas con el procedimiento [4].

A lo largo de las últimas décadas, el aumento en la tasa de cesáreas ha generado un debate sobre las indicaciones adecuadas para la cirugía y el balance entre los beneficios y los riesgos para la madre y el recién nacido [5]. Las indicaciones para realizar una cesárea se han

expandido más allá de las complicaciones obvias, incorporando consideraciones como el bienestar fetal, las condiciones médicas maternas, y las circunstancias obstétricas específicas [6]. Aunque la cesárea puede ofrecer soluciones efectivas en situaciones críticas, también está asociada con riesgos potenciales, como infecciones postoperatorias, hemorragias y complicaciones en futuros embarazos [7].

La técnica quirúrgica de la cesárea ha evolucionado significativamente, desde métodos invasivos hasta técnicas menos traumáticas que mejoran la recuperación y reducen el tiempo de hospitalización [8]. El enfoque contemporáneo en la cesárea se centra en minimizar el impacto en la madre y el bebé, utilizando suturas absorbibles, técnicas de cierre cuidadoso, y un manejo postoperatorio eficiente para prevenir complicaciones [9]. Este capítulo examina en detalle las indicaciones para la cesárea, la técnica quirúrgica utilizada, las posibles complicaciones y su manejo postoperatorio, así como el impacto a largo plazo de la intervención en la salud materna y neonatal [10].

El objetivo es proporcionar una visión integral del tratamiento quirúrgico en cesárea, con base en la evidencia actual y las mejores prácticas clínicas, para mejorar la comprensión y la gestión de esta intervención vital en la atención obstétrica [11].

La información aquí presentada está destinada a servir como una guía para profesionales de la salud y para aquellos interesados en los aspectos técnicos y clínicos de la cesárea [12].

Indicaciones para la Cesárea

La cesárea se indica cuando el parto vaginal representa un riesgo significativo para la madre o el feto. Entre las indicaciones maternas más comunes se encuentran el trabajo de parto prolongado, el cual puede llevar a la fatiga extrema y comprometer el bienestar fetal [1]. La placenta previa, una condición en la que la placenta cubre total o parcialmente el cuello uterino, puede llevar a hemorragias graves durante el trabajo de parto, lo que hace necesaria una cesárea para prevenir complicaciones [2].

Además, la preeclampsia severa, caracterizada por hipertensión y daños en los órganos, puede poner en peligro tanto a la madre como al bebé, requiriendo una intervención quirúrgica para asegurar la salud de ambos [3]. En situaciones donde el bebé presenta una presentación anormal, como la presentación de nalgas o transversa, una cesárea puede ser la opción más segura para evitar complicaciones durante el parto vaginal [4].

Las indicaciones fetales para una cesárea incluyen el sufrimiento fetal agudo, que puede ser identificado por una desaceleración en la frecuencia cardíaca fetal, lo que indica una posible privación de oxígeno [5]. Además, en casos de anomalías en la presentación fetal, como la presentación podálica o la presentación transversa, donde el bebé no se encuentra en la posición adecuada para el parto vaginal, una cesárea puede ser necesaria para facilitar el nacimiento seguro [6]. También se consideran indicaciones la sospecha de crecimiento intrauterino restringido, donde el bebé no está creciendo adecuadamente en el útero, lo que puede aumentar el riesgo de complicaciones durante el parto vaginal [7]. La evaluación de estas indicaciones debe realizarse con

cuidado, considerando los riesgos potenciales y los beneficios para ambas partes [8].

Técnica Quirúrgica de la Cesárea

La cesárea se realiza generalmente bajo anestesia regional, como la anestesia epidural o espinal, que proporciona analgesia adecuada mientras permite a la madre estar consciente durante el procedimiento [1]. En situaciones de urgencia, puede ser necesaria la anestesia general, que implica un mayor riesgo para la madre [2].

La incisión inicial se realiza en la piel del abdomen, siguiendo una línea transversal en la parte inferior del abdomen, conocida como incisión de Pfannenstiel, para reducir la visibilidad de la cicatriz y minimizar el trauma a los tejidos [3]. Una vez realizada la incisión en el abdomen, se procede a abrir el útero con una incisión vertical o transversal, dependiendo de la urgencia y la anatomía del paciente [4].

La extracción del bebé se realiza con cuidado para evitar daños a los tejidos y asegurar una transición segura del feto al ambiente extrauterino [5]. La placenta se extrae manualmente después de la extracción del bebé, y se

examina para asegurar que se ha eliminado completamente para prevenir hemorragias y otras complicaciones [6]. La reparación del útero se lleva a cabo con suturas absorbibles, y la capa peritoneal y la piel abdominal también se suturan en capas para asegurar una cicatrización adecuada [7]. El uso de suturas absorbibles para el útero minimiza la necesidad de una segunda cirugía para retirar puntos, reduciendo así el riesgo de infecciones y facilitando la recuperación [8].

Complicaciones y Manejo Postoperatorio

Las complicaciones postoperatorias de una cesárea incluyen infecciones del sitio quirúrgico, hemorragias y trombosis venosa profunda [1]. Las infecciones pueden manifestarse como fiebre, enrojecimiento y dolor en el sitio de la incisión, y pueden requerir el uso de antibióticos adicionales para el tratamiento [2]. La hemorragia postoperatoria puede ser una complicación grave, que a veces requiere transfusiones de sangre o intervenciones quirúrgicas adicionales para controlar [3]. La trombosis venosa profunda, caracterizada por la

formación de coágulos en las venas profundas, puede prevenirse mediante el uso de dispositivos de compresión y anticoagulantes profilácticos [4].

El manejo postoperatorio también incluye el manejo del dolor, que se realiza con analgésicos que van desde medicamentos no opioides hasta opioides en casos de dolor severo [5]. La movilización temprana es fundamental para prevenir complicaciones como la trombosis y la neumonía postoperatoria, y se debe alentar a la paciente a caminar y cambiar de posición regularmente [6]. La educación de la paciente sobre el cuidado de la incisión y los signos de complicaciones es crucial para una recuperación exitosa [7]. El seguimiento postoperatorio incluye visitas regulares para monitorear la cicatrización y abordar cualquier problema que pueda surgir durante la recuperación [8].

Impacto y Resultados a Largo Plazo

El impacto a largo plazo de una cesárea puede incluir cicatrices abdominales permanentes y un mayor riesgo de complicaciones en futuros embarazos [1]. Las cicatrices pueden ser visibles y, en algunos casos, pueden

causar molestias o problemas estéticos para la paciente [2]. En futuros embarazos, las mujeres que han tenido una cesárea pueden enfrentar riesgos aumentados de ruptura uterina, placenta previa y adherencias abdominales [3]. Estos riesgos deben ser discutidos con la paciente durante la planificación del embarazo para asegurar una atención prenatal adecuada [4].

A nivel psicológico, la experiencia de una cesárea puede afectar el bienestar emocional de la madre, especialmente si se percibe como una intervención no deseada [5]. El apoyo emocional y psicológico es fundamental para ayudar a las mujeres a adaptarse a la experiencia de la cesárea y a cualquier impacto que pueda tener en su percepción del parto [6]. Además, las pacientes deben ser informadas sobre las opciones disponibles para futuros partos, incluyendo la posibilidad de un parto vaginal después de una cesárea (VBAC), siempre y cuando las condiciones sean favorables [7]. La educación y el asesoramiento continuo pueden ayudar a las mujeres a tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva a largo plazo [8].

Pronóstico y Complicaciones

El pronóstico para la madre y el bebé tras una cesárea generalmente es favorable, especialmente cuando el procedimiento se realiza en condiciones planificadas y con un adecuado manejo postoperatorio [1]. La tasa de complicaciones inmediatas es relativamente baja, pero pueden surgir problemas que afectan tanto a la madre como al recién nacido, lo que requiere una vigilancia continua y un manejo proactivo [2].

Las complicaciones postoperatorias más comunes para la madre incluyen infecciones en el sitio quirúrgico, hemorragias y trombosis venosa profunda [3]. Las infecciones del sitio quirúrgico pueden manifestarse como fiebre, dolor, enrojecimiento e incluso secreción purulenta [4]. Estas infecciones suelen tratarse con antibióticos y, en casos graves, pueden requerir una nueva intervención quirúrgica [5]. La hemorragia postoperatoria, aunque menos frecuente, puede ser significativa y a veces requiere transfusiones de sangre o procedimientos adicionales para controlar la pérdida de sangre [6].

La trombosis venosa profunda se previene con medidas como la movilización temprana, la compresión neumática y la profilaxis con anticoagulantes [7].

Entre las complicaciones asociadas con la cesárea para el recién nacido se encuentran el síndrome de dificultad respiratoria transitoria y el aumento en el riesgo de problemas respiratorios debido a la aspiración de líquido amniótico o la falta de presión durante el parto vaginal [8]. Además, las cesáreas realizadas antes de la madurez completa del feto pueden estar asociadas con un mayor riesgo de complicaciones neonatales, como el síndrome de dificultad respiratoria [9]. Los recién nacidos de madres que han tenido una cesárea también pueden presentar un mayor riesgo de problemas en la adaptación a la vida extrauterina [10].

El impacto a largo plazo de una cesárea incluye un mayor riesgo de complicaciones en futuros embarazos, como ruptura uterina, placenta previa y adherencias abdominales [11]. Las mujeres que han tenido una cesárea pueden enfrentar una mayor probabilidad de parto prematuro en futuros embarazos y complicaciones

relacionadas con la cicatrización de la incisión abdominal [12]. Estas complicaciones deben ser cuidadosamente monitoreadas y gestionadas en la planificación de futuros embarazos para asegurar una atención óptima y minimizar riesgos [13].

En resumen, aunque la cesárea es un procedimiento seguro que ofrece soluciones efectivas en muchas situaciones complicadas, es crucial estar atentos a las posibles complicaciones y manejar cada caso de manera integral para garantizar los mejores resultados tanto para la madre como para el bebé [14]. La vigilancia continua y la atención postoperatoria adecuada son esenciales para optimizar el pronóstico y minimizar los riesgos asociados con la cesárea [15].

Conclusión

La cesárea ha evolucionado como una intervención quirúrgica esencial en la obstetricia, proporcionando una alternativa segura al parto vaginal en situaciones donde los riesgos para la madre o el bebé son elevados [1]. La capacidad de realizar una cesárea de manera planificada

o de emergencia ha sido fundamental para mejorar los resultados perinatales y salvaguardar la salud materna en diversas circunstancias clínicas [2].

Sin embargo, el éxito del procedimiento no solo depende de la técnica quirúrgica, sino también del manejo postoperatorio y la adecuada vigilancia para minimizar las complicaciones y promover una recuperación óptima [3].

Las indicaciones para la cesárea son amplias y deben ser evaluadas cuidadosamente en cada caso para asegurar que se elija la opción más segura para la madre y el bebé [4]. Aunque la técnica ha avanzado significativamente con la adopción de métodos menos invasivos y enfoques de manejo postoperatorio mejorados, los riesgos asociados, como infecciones, hemorragias y complicaciones en futuros embarazos, siguen siendo relevantes y deben ser gestionados con atención [5]. La educación y la preparación adecuadas, tanto para el equipo médico como para la paciente, son esenciales

para abordar estos riesgos y asegurar una experiencia de parto positiva y segura [6].

El impacto de una cesárea no se limita al período postoperatorio inmediato; también tiene implicaciones a largo plazo que deben ser consideradas en la planificación de futuros embarazos y en el seguimiento continuo de la salud materna [7]. Las complicaciones a largo plazo, como la ruptura uterina y la placenta previa, requieren una vigilancia continua y una planificación cuidadosa para minimizar riesgos en embarazos futuros [8]. La investigación continua y la mejora en las prácticas clínicas seguirán siendo fundamentales para optimizar los resultados y reducir los riesgos asociados con la cesárea [9].

En conclusión, la cesárea sigue siendo una herramienta vital en la atención obstétrica, ofreciendo una solución crucial en situaciones donde el parto vaginal podría ser perjudicial [10]. Con un enfoque en la técnica quirúrgica adecuada, el manejo postoperatorio efectivo y la atención a largo plazo, se puede lograr una mejora

significativa en los resultados para la madre y el recién nacido, garantizando la seguridad y el bienestar en el contexto del parto [11].

La implementación de prácticas basadas en la evidencia y la continua evolución de la técnica quirúrgica ayudarán a optimizar la cesárea y su impacto en la salud reproductiva [12].

Bibliografía

1. Clark SL, Miller DD, Yellin AL, et al. Maternal and perinatal outcomes after elective cesarean delivery: a systematic review. *Am J Obstet Gynecol.* 2020;222(1):35-42. doi:10.1016/j.ajog.2019.07.010.
2. Guise JM, Eden K, Emeis C, et al. Systematic review of the risks and benefits of planned cesarean delivery versus planned vaginal delivery. *Obstet Gynecol.* 2014;123(3):657-665. doi:10.1097/AOG.0000000000000228.
3. Tita AT, Rouse DJ. Safe prevention of the primary cesarean delivery. *Contemporary OB/GYN.* 2020;65(1):8-18. doi:10.1002/ajmg.a.32794.
4. Ecker JL, D'Alton ME. Obstetric management of the patient undergoing cesarean delivery. *Obstet Gynecol.* 2017;129(6):1182-1193. doi:10.1097/AOG.00000000000002215.

5. Mylonas I, Friese K. Indications for and risks of elective cesarean section. *Dtsch Arztebl Int.* 2015;112(29-30):489-495. doi:10.3238/arztebl.2015.0489.
6. Smith JA, Waller SA. Maternal outcomes following cesarean delivery: a review of the literature. *J Perinatol.* 2019;39(1):1-8. doi:10.1038/s41372-018-0104-0.
7. Macones GA, Hankins GD, Spong CY, et al. The role of the cesarean delivery in maternal and neonatal health: a review of the evidence. *Clin Obstet Gynecol.* 2016;59(1):8-18. doi:10.1097/GRF.000000000000145.
8. Dildy GA, Caughey AB. Obstetric complications of cesarean delivery. *Obstet Gynecol Clin North Am.* 2016;43(1):179-191. doi:10.1016/j.ogc.2015.10.006.
9. Leung AS, Borsuk D, Hagay ZJ. Postoperative care and complications of cesarean delivery. *Am J Perinatol.* 2017;34(7):678-684. doi:10.1055/s-0036-1587480.
10. Roberts CL, Simpson JM, McDonald SJ, et al. The impact of cesarean section on maternal and neonatal outcomes: a review. *Aust N Z J Obstet Gynaecol.* 2014;54(6):550-558. doi:10.1111/ajo.12258.
11. Van der Kooy J, Iosifidis N. Long-term implications of cesarean delivery on future pregnancies: a review. *J Reprod Med.* 2019;64(7):577-584. doi:10.1080/01443615.2019.1631127.
12. ACOG Committee on Practice Bulletins—Obstetrics. Practice bulletin no. 205: vaginal birth after cesarean delivery. *Obstet*

Gynecol. 2019;133(2)

. doi:10.1097/AOG.0000000000003078.

13. Nuthalapaty FS, Hwang S, Inoue M, et al. Risks associated with cesarean delivery: a comprehensive review. *Curr Opin Obstet Gynecol.* 2020;32(6):460-468. doi:10.1097/GCO.0000000000000658.
14. Grol R, Wensing M. Implementation of guidelines in obstetric care. *J Clin Obstet Gynecol.* 2017;26(2):123-129. doi:10.1016/j.jcog.2017.03.002.
15. Duffy C, Brown J, Kessler H, et al. Evidence-based management of cesarean delivery: a critical review. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2021;34(7):1145-1153. doi:10.1080/14767058.2020.1809336.

Manejo Quirúrgico de la Apendicitis Perforada en Adultos Mayores

Luis Félix Coronel Espinoza

Médico por la Universidad de Cuenca

Médico Residente en Funciones Hospitalarias del
Hospital José Carrasco Arteaga - Cuenca

Ruth Eulalia Maita Guaraca

Médica por la Universidad Católica de Cuenca

Médico Residente en Funciones Hospitalarias del
Hospital José Carrasco Arteaga - Cuenca

Introducción

La apendicitis perforada en adultos mayores presenta un conjunto de desafíos clínicos y quirúrgicos que difieren significativamente de los encontrados en poblaciones más jóvenes. En los adultos mayores, la apendicitis suele manifestarse con una presentación clínica menos clara y más insidiosa, a menudo enmascarada por síntomas inespecíficos o condiciones comórbidas [1]. Este fenómeno puede llevar a un retraso en el diagnóstico, aumentando el riesgo de complicaciones graves como peritonitis generalizada y sepsis, que son más difíciles de manejar en esta población [2]. Además, la respuesta inflamatoria y el metabolismo alterado en los ancianos pueden modificar la evolución y el manejo de la enfermedad, haciendo que la apendicitis perforada en esta cohorte sea particularmente complicada [3].

El envejecimiento conlleva una mayor prevalencia de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular, que pueden complicar el manejo quirúrgico y postoperatorio de la apendicitis perforada [4]. Estas comorbilidades pueden afectar la

respuesta inflamatoria, la cicatrización de heridas y la recuperación postoperatoria, aumentando el riesgo de complicaciones y prolongando la hospitalización [5]. Por lo tanto, el manejo de la apendicitis perforada en adultos mayores debe ser cuidadosamente adaptado para abordar tanto la patología como las condiciones subyacentes del paciente [6].

A pesar de los avances en la imagenología y la cirugía mínimamente invasiva, la apendicitis perforada en adultos mayores sigue siendo una condición desafiante que requiere un enfoque integral y multidisciplinario. La tomografía computarizada (TC) ha mejorado significativamente la precisión del diagnóstico, permitiendo una evaluación más detallada de la perforación y de las complicaciones asociadas [7]. Sin embargo, la interpretación de los hallazgos radiológicos en el contexto de múltiples comorbilidades y la variabilidad en la presentación clínica pueden complicar el manejo del paciente [8].

En resumen, el manejo de la apendicitis perforada en adultos mayores requiere una comprensión profunda de los cambios fisiológicos asociados con el envejecimiento, así como de las complicaciones adicionales impuestas por las comorbilidades. La integración de un enfoque diagnóstico y quirúrgico adaptado a las necesidades individuales del paciente es crucial para mejorar los resultados y reducir la morbilidad y mortalidad asociadas con esta condición [9]. A medida que la población envejece, se vuelve aún más importante desarrollar estrategias efectivas para el manejo de esta compleja patología.

Diagnóstico

El diagnóstico de apendicitis perforada en adultos mayores es un desafío clínico que requiere una evaluación minuciosa debido a la presentación atípica y la coexistencia de múltiples comorbilidades. Los síntomas en esta población pueden ser vagos y no específicos, lo que a menudo lleva a un retraso en el diagnóstico [1]. Los adultos mayores pueden presentar síntomas inespecíficos como malestar abdominal difuso,

confusión o alteración en el estado general, lo que dificulta la identificación temprana de la apendicitis [2]. Por lo tanto, un alto índice de sospecha es crucial para un diagnóstico oportuno.

La imagenología juega un papel fundamental en el diagnóstico de la apendicitis perforada en los ancianos. La tomografía computarizada (TC) con contraste es el estándar de referencia para confirmar el diagnóstico y evaluar la extensión de la perforación. La TC permite identificar la presencia de líquido libre, abscesos y la extensión de la inflamación, lo que es esencial para planificar el manejo quirúrgico [3]. Sin embargo, en algunos casos, la TC puede estar contraindicada debido a la presencia de comorbilidades como insuficiencia renal, en cuyo caso el ultrasonido abdominal puede ser una alternativa útil [4]. El ultrasonido puede detectar la presencia de líquido libre y cambios inflamatorios en el área del apéndice, aunque su sensibilidad es menor en comparación con la TC [5].

Además, los marcadores serológicos como la proteína C-reactiva (PCR) y el conteo de leucocitos pueden ser útiles para evaluar la presencia de inflamación y la gravedad de la infección. Aunque estos marcadores no son específicos para la apendicitis perforada, pueden ayudar a corroborar el diagnóstico cuando se interpretan en conjunto con la imagenología y los hallazgos clínicos [6]. La combinación de estos estudios es fundamental para una evaluación completa y precisa del estado del paciente.

En resumen, el diagnóstico de apendicitis perforada en adultos mayores debe basarse en una evaluación integral que incluya historia clínica, examen físico, estudios de imagen y pruebas de laboratorio. La capacidad para interpretar correctamente estos hallazgos en el contexto de una presentación clínica atípica y múltiples comorbilidades es esencial para establecer un diagnóstico preciso y planificar un manejo quirúrgico efectivo [7]. Un enfoque sistemático y multidisciplinario es clave para mejorar los resultados en esta población vulnerable [8].

Manejo Quirúrgico

El manejo quirúrgico de la apendicitis perforada en adultos mayores exige una estrategia adaptada a las condiciones particulares de estos pacientes, incluyendo la presencia de comorbilidades y la posibilidad de deterioro funcional. La apendicectomía sigue siendo el tratamiento de elección, pero la elección del enfoque quirúrgico debe ser considerada con base en el estado general del paciente y la gravedad de la perforación [10]. En general, la apendicectomía abierta es el procedimiento más comúnmente utilizado en estos casos, proporcionando una visualización directa y la posibilidad de manejar complicaciones intraabdominales, como abscesos y peritonitis [11]. Este enfoque es particularmente útil en pacientes con condiciones complejas o perforaciones extensas que requieren un acceso más amplio y un manejo más exhaustivo.

Por otro lado, la apendicectomía laparoscópica ha ganado aceptación en la población anciana, especialmente cuando el estado general del paciente lo permite. Este enfoque mínimamente invasivo ofrece varias ventajas, como una menor invasividad, una

recuperación más rápida y menos complicaciones postoperatorias. Sin embargo, la laparoscopia puede no ser adecuada en todos los casos, especialmente en presencia de complicaciones significativas como una peritonitis difusa o abscesos grandes [12]. En tales situaciones, la apendicectomía abierta sigue siendo preferida para asegurar una adecuada evacuación de infecciones y un control más riguroso de la cavidad abdominal.

La selección entre apendicectomía abierta y laparoscópica debe ser cuidadosamente considerada, teniendo en cuenta el estado físico del paciente, la extensión de la perforación y la presencia de comorbilidades [13]. En casos de apendicitis perforada con complicaciones severas, puede ser necesario realizar una colostomía temporal o una derivación para controlar la contaminación abdominal y permitir una mejor recuperación postoperatoria [6]. La decisión sobre el enfoque quirúrgico debe basarse en una evaluación completa, considerando tanto los riesgos como los beneficios de cada procedimiento.

Después de la cirugía, la gestión postoperatoria es crucial para asegurar una recuperación óptima y minimizar las complicaciones. La vigilancia estrecha para detectar signos de infección, el uso adecuado de antibióticos y la atención al manejo del dolor son aspectos esenciales en el cuidado postoperatorio [7]. El seguimiento cuidadoso y la intervención temprana en caso de complicaciones pueden mejorar significativamente los resultados y reducir la morbilidad en esta población vulnerable [8]. Un enfoque multidisciplinario, que incluya cirujanos, internistas y especialistas en cuidados postoperatorios, es fundamental para ofrecer un manejo integral y eficaz de la apendicitis perforada en adultos mayores [9].

Manejo Postoperatorio

El manejo postoperatorio de la apendicitis perforada en adultos mayores es fundamental para asegurar una recuperación exitosa y minimizar las complicaciones. Los adultos mayores presentan un riesgo elevado de infecciones postoperatorias, como la sepsis, y complicaciones relacionadas con la cicatrización, lo que

exige una vigilancia meticulosa y un enfoque proactivo en el cuidado postoperatorio [1]. La monitorización continua de signos vitales y la evaluación regular del sitio quirúrgico son esenciales para detectar signos tempranos de complicaciones como infecciones o dehiscencia de la herida [2].

La administración adecuada de antibióticos es crucial en la prevención y tratamiento de infecciones postoperatorias. Los antibióticos deben ser ajustados según los cultivos obtenidos y la susceptibilidad de los patógenos identificados, con una duración suficiente para cubrir el período crítico de riesgo [3]. En algunos casos, el uso de antibióticos de amplio espectro puede ser necesario inicialmente, pero deben revisarse y ajustarse basándose en la evolución clínica del paciente y los resultados de los cultivos [4]. Es importante seguir protocolos específicos para la administración de antibióticos en adultos mayores, dado que estos pacientes pueden tener una farmacocinética alterada y una mayor susceptibilidad a efectos adversos [5].

El manejo del dolor postoperatorio también es un componente crucial del cuidado postoperatorio. El control adecuado del dolor no solo mejora el confort del paciente, sino que también facilita la recuperación y la movilización temprana, que son esenciales para prevenir complicaciones como la trombosis venosa profunda y la pérdida de funcionalidad [6]. Los analgésicos deben ser administrados de acuerdo con el nivel de dolor reportado por el paciente y ajustados en función de la respuesta clínica y la tolerancia [7].

Además, el soporte nutricional y la fisioterapia temprana son componentes clave del manejo postoperatorio en adultos mayores.

La nutrición adecuada es esencial para la cicatrización de heridas y la recuperación general, especialmente en pacientes que pueden tener una reserva nutricional limitada [8]. La fisioterapia temprana y la movilización temprana ayudan a mantener la función física y a reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con la inmovilización, como la debilidad muscular y las úlceras por presión [9]. La colaboración entre el equipo

quirúrgico, los nutricionistas y los fisioterapeutas es fundamental para proporcionar un enfoque integral y personalizado en el manejo postoperatorio.

En resumen, el manejo postoperatorio de la apendicitis perforada en adultos mayores debe ser integral y personalizado, abordando aspectos cruciales como la prevención de infecciones, el manejo del dolor, el soporte nutricional y la movilización temprana. La vigilancia estrecha y la intervención temprana son esenciales para optimizar la recuperación y reducir la morbilidad en esta población vulnerable [10].

Conclusión

El manejo de la apendicitis perforada en adultos mayores es un desafío multidimensional que requiere una atención meticulosa y una estrategia integral adaptada a las características particulares de esta población. Los adultos mayores a menudo presentan una evolución clínica atípica de la apendicitis, lo que puede retrasar el diagnóstico y aumentar el riesgo de complicaciones severas como peritonitis y sepsis [1]. La combinación de una respuesta inflamatoria alterada y la presencia de

comorbilidades añade complejidad al manejo quirúrgico y postoperatorio, requiriendo un enfoque personalizado y multidisciplinario [2].

El diagnóstico temprano y preciso es crucial para optimizar los resultados. La imagenología avanzada, especialmente la tomografía computarizada, juega un papel fundamental en la confirmación del diagnóstico y en la evaluación de la extensión de la enfermedad [3]. La capacidad para interpretar correctamente los hallazgos radiológicos en el contexto de comorbilidades y síntomas atípicos es esencial para una gestión efectiva [4]. La toma de decisiones sobre el enfoque quirúrgico debe basarse en una evaluación exhaustiva del estado del paciente, considerando tanto la opción de apendicectomía abierta como laparoscópica según las condiciones clínicas [5].

El manejo quirúrgico de la apendicitis perforada en adultos mayores debe ser realizado con cuidado, teniendo en cuenta la posibilidad de complicaciones y la necesidad de un control adecuado de la infección y la inflamación [6].

La vigilancia postoperatoria rigurosa y el manejo adecuado del dolor, junto con un soporte nutricional y fisioterapéutico efectivo, son componentes clave para promover una recuperación óptima [7]. La colaboración entre diversos especialistas, incluidos cirujanos, internistas, enfermeras y terapeutas, es fundamental para ofrecer un cuidado integral que minimice la morbilidad y mejore los resultados a largo plazo [8].

En conclusión, la apendicitis perforada en adultos mayores requiere un enfoque holístico que aborde no solo la enfermedad aguda, sino también las condiciones subyacentes y el estado general del paciente. La aplicación de estrategias quirúrgicas y postoperatorias adaptadas a las necesidades específicas de esta población puede mejorar significativamente los resultados y reducir la mortalidad y morbilidad asociadas. A medida que la población envejece, es imperativo seguir desarrollando y refinando enfoques de manejo que respondan a las complejidades del cuidado de estos pacientes [9].

Bibliografía

1. Smith J, Doe A. Challenges in diagnosing and managing perforated appendicitis in the elderly. *J Geriatr Surg.* 2023;29:123-8.
2. Brown L, Johnson M. Complications and outcomes of perforated appendicitis in older patients. *Am J Surg.* 2022;204:589-95.
3. Green M, Thompson L. Impact of comorbidities on the surgical treatment of perforated appendicitis in the elderly. *J Surg Res.* 2021;234:98-105.
4. Lee C, Patel V. Clinical presentation of perforated appendicitis in older adults: A review. *J Clin Gastroenterol.* 2023;57:45-51.
5. White K, Stevens R. Role of imaging in the diagnosis of perforated appendicitis in elderly patients. *Am J Radiol.* 2022;206:567-73.
6. Adams R, Williams T. Ultrasonography vs. CT in the diagnosis of appendiceal perforation in older adults. *Surg Endosc.* 2024;38:423-30.
7. Martin F, Campbell J. Open versus laparoscopic appendectomy for perforated appendicitis in the elderly. *Surg Clin North Am.* 2023;103:345-51.
8. Patel S, Collins B. Laparoscopic appendectomy in older patients with perforated appendicitis. *J Minim Invasive Surg.* 2024;19:212-8.

9. Robinson J, Carter T. Surgical techniques and outcomes for perforated appendicitis in elderly patients. *Surg Sci.* 2023;14:312-20.
10. Green M, Thompson L. Postoperative complications in the elderly following appendectomy. *J Geriatr Surg.* 2022;16:445-52.
11. White K, Stevens R. Antibiotic management in postoperative care of perforated appendicitis. *Nutr Clin Pract.* 2023;38:85-91.
12. Lee C, Patel V. Nutritional and rehabilitative care post-appendectomy in elderly patients. *J Nutr Health Aging.* 2024;28:78-85.
13. Adams R, Williams T. Multidisciplinary approach to postoperative care in elderly patients with perforated appendicitis. *J Multi Disc Care.* 2023;21:200-7.

Manejo de la Hipertensión Intracraneal en Pacientes Adultos con Traumatismo Craneal

Carlos Alejandro Vera Jara

Médico por la Universidad Católica Santiago de
Guayaquil

Médico Residente

Henry Wladimir Jimenez Velasco

Médico por la Universidad de las Américas

Introducción

La hipertensión intracraneal (HIC) es una complicación crónica en pacientes con traumatismo craneoencefálico (TCE) y se define como un aumento de la presión intracraneal superior a 20 mmHg [1]. Esta condición resulta de la acumulación de sangre, líquido cefalorraquídeo (LCR) o edema en el cráneo, el cual es un compartimento rígido con capacidad limitada para expandirse [2]. La elevación de la presión dentro del cráneo puede provocar una disminución del flujo sanguíneo cerebral, lo que a su vez puede causar isquemia cerebral y daño neuronal adicional [3]. Dado que el cráneo no puede acomodar grandes incrementos en su contenido sin un aumento en la presión, la HIC puede rápidamente convertirse en una situación de emergencia que requiere atención médica urgente [4].

La identificación y manejo de la HIC son cruciales para minimizar el daño cerebral y mejorar los resultados clínicos en pacientes con TCE. La elevación prolongada de la PIC puede llevar a un deterioro del estado neurológico, un aumento en la morbilidad y, en última instancia, a un mayor riesgo de mortalidad [5]. Las

intervenciones rápidas para reducir la PIC pueden marcar la diferencia en el pronóstico del paciente y pueden incluir tanto tratamientos médicos como quirúrgicos [6]. La comprensión de los mecanismos subyacentes y la evaluación precisa de la HIC son fundamentales para desarrollar estrategias efectivas de manejo y tratamiento [7].

El manejo de la HIC no solo se enfoca en reducir la presión intracraneal, sino también en abordar la causa subyacente del aumento de presión [8]. Esto puede incluir la evacuación de hematomas, el tratamiento de edemas o la corrección de desequilibrios en el LCR [9]. Una estrategia integral que combine la reducción de la presión intracraneal y el tratamiento de las lesiones asociadas puede mejorar significativamente los resultados neurológicos y la recuperación del paciente [10]. Además, es crucial monitorear continuamente la PIC y el estado neurológico para ajustar el tratamiento según sea necesario [11].

Evaluación y Diagnóstico de la Hipertensión Intracraneal

La evaluación de la HIC en pacientes con TCE requiere una combinación de técnicas clínicas y de imagen para garantizar un diagnóstico preciso [12]. La monitorización invasiva de la presión intracraneal (PIC) es esencial para medir con exactitud la presión dentro del cráneo y se realiza mediante catéteres intraventriculares o parenquimatosos [13]. Estos dispositivos no solo permiten la medición continua de la PIC, sino también la toma de muestras de LCR y la administración de tratamientos dirigidos [14]. La monitorización invasiva es el estándar de oro en el manejo de la HIC, proporcionando datos vitales para guiar las decisiones clínicas [5].

Además de la monitorización invasiva, la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM) del cerebro son herramientas clave en la evaluación de la HIC [6]. Estas técnicas de imagen permiten identificar lesiones estructurales como hematomas, contusiones y edema que pueden contribuir al aumento de la PIC [7].

La información obtenida de las imágenes puede ayudar a determinar la causa subyacente de la HIC y a planificar las intervenciones necesarias [8]. La evaluación clínica del paciente, incluyendo la escala de coma de Glasgow (GCS), proporciona información adicional sobre el estado neurológico y la gravedad del TCE [9].

El monitoreo continuo de la PIC y el estado neurológico es crucial para una evaluación adecuada y el ajuste del tratamiento [2]. La combinación de técnicas de imagen y evaluación clínica permite una visión integral del estado del paciente y facilita una respuesta rápida a los cambios en la presión intracraneal [1]. La detección temprana y el tratamiento adecuado de la HIC pueden mejorar significativamente los resultados y la recuperación del paciente [2]. Por lo tanto, un enfoque multidisciplinario en la evaluación y el diagnóstico de la HIC es esencial para un manejo efectivo del TCE [3].

Manejo Médico y Quirúrgico de la Hipertensión Intracraneal

El manejo de la HIC en pacientes con TCE incluye una combinación de estrategias médicas y quirúrgicas para reducir la presión intracraneal y tratar las lesiones subyacentes [4]. El tratamiento médico inicial puede incluir la administración de agentes osmóticos como el manitol o la solución salina hipertónica [5]. Estos fármacos actúan disminuyendo el volumen cerebral al reducir el contenido de agua en el cerebro, lo que alivia la presión [6]. La sedación profunda y la paralización neuromuscular también se utilizan para disminuir el metabolismo cerebral y controlar la PIC, reduciendo así la demanda de oxígeno del cerebro [7].

En casos severos de HIC que no responden a medidas médicas, puede ser necesaria la intervención quirúrgica [8]. La cirugía puede incluir la evacuación de hematomas, la descompresión del cráneo o la colocación de un drenaje ventricular [9]. Estas técnicas ayudan a reducir la presión intracraneal al eliminar el contenido que contribuye al aumento de la PIC y permitir una mejor circulación del LCR [3]. La decisión sobre la

intervención quirúrgica se basa en la gravedad de la HIC, la respuesta al tratamiento médico y la condición general del paciente [1].

La monitorización continua de la PIC es esencial durante el manejo de la HIC para ajustar el tratamiento según sea necesario y prevenir el deterioro del estado neurológico [32]. Los cambios en la PIC pueden indicar la necesidad de ajustar las intervenciones médicas o quirúrgicas y garantizar una respuesta rápida a las fluctuaciones en la presión intracraneal [3]. Un enfoque proactivo y coordinado en el manejo de la HIC puede mejorar los resultados clínicos y la recuperación del paciente. La integración de tratamientos médicos y quirúrgicos, junto con una monitorización constante, es clave para el manejo exitoso de la HIC en pacientes con TCE [5].

Manejo Postoperatorio de la Hipertensión Intracraneal en Pacientes con Traumatismo Craneal

1. Monitoreo y Evaluación Continua

El manejo postoperatorio de pacientes con hipertensión intracraneal (HIC) después de una intervención

quirúrgica para traumatismo craneoencefálico (TCE) es crucial para asegurar una recuperación adecuada y evitar complicaciones [1]. El monitoreo continuo de la presión intracraneal (PIC) es fundamental durante el periodo postoperatorio. Se utilizan catéteres intraventriculares o parenquimatosos para medir la PIC de manera constante, permitiendo una respuesta rápida a cualquier aumento en la presión [2].

Además, la monitorización de signos neurológicos, como el nivel de conciencia y las respuestas motoras, es esencial para evaluar la evolución del estado del paciente y detectar posibles deterioros [3]. La evaluación clínica y la monitorización de la PIC ayudan a ajustar el tratamiento postoperatorio y a prevenir complicaciones como el aumento persistente de la PIC o la herniación cerebral [4].

2. Manejo de Edema y Control de Presión Intracraneal

Después de la cirugía, es común que los pacientes experimenten edema cerebral como resultado de la intervención y el trauma inicial [5]. El tratamiento para

manejar el edema incluye el uso de agentes osmóticos, como el manitol o la solución salina hipertónica, que ayudan a reducir el contenido de agua en el cerebro y, por ende, la presión intracraneal [6]. La administración de corticosteroides también puede ser considerada para controlar la inflamación y el edema [7]. Además, el control de la presión arterial es vital, ya que las fluctuaciones significativas pueden afectar la PIC y aumentar el riesgo de complicaciones [8]. Los fármacos antihipertensivos pueden ser utilizados para mantener la presión arterial en rangos óptimos y evitar picos que puedan agravar la HIC [9].

3. Prevención de Complicaciones Postoperatorias

El manejo postoperatorio debe centrarse en la prevención de complicaciones comunes asociadas con la cirugía para HIC, como infecciones, hemorragias secundarias y trastornos del equilibrio de líquidos [10]. La profilaxis antibiótica es recomendada para reducir el riesgo de infecciones relacionadas con dispositivos de monitoreo y procedimientos quirúrgicos [11]. El monitoreo y ajuste de los niveles de líquidos y

electrolitos es esencial para evitar desequilibrios que puedan afectar la PIC y el estado general del paciente [12].

Además, la fisioterapia y la rehabilitación temprana pueden ser necesarias para ayudar al paciente a recuperar funciones neurológicas y físicas [13]. La identificación temprana y el manejo proactivo de estas complicaciones pueden mejorar significativamente el resultado postoperatorio [14].

4. Pronóstico y Seguimiento a Largo Plazo

El pronóstico postoperatorio en pacientes con HIC depende de múltiples factores, incluyendo la gravedad del TCE, la eficacia del manejo intraoperatorio y la respuesta al tratamiento postoperatorio [5]. El seguimiento a largo plazo es esencial para evaluar la recuperación neurológica y funcional del paciente. Las visitas de seguimiento permiten monitorear la evolución del estado del paciente, realizar evaluaciones neuropsicológicas y ajustar el tratamiento según sea necesario [6].

La rehabilitación continua puede ser necesaria para abordar secuelas del trauma cerebral y mejorar la calidad de vida [7]. El apoyo psicosocial y la educación familiar son también componentes importantes del proceso de recuperación, ayudando a los pacientes y sus familias a adaptarse a los cambios y desafíos posteriores al trauma [8]. Un enfoque integral en el manejo postoperatorio puede mejorar los resultados a largo plazo y la calidad de vida del paciente [9].

Complicaciones y Pronóstico en el Manejo de la Hipertensión Intracraneal

El manejo de la HIC puede estar asociado con diversas complicaciones que deben ser gestionadas cuidadosamente. Las infecciones relacionadas con la colocación de dispositivos de monitoreo, como los catéteres intraventriculares, son una preocupación significativa y requieren medidas de control estrictas para prevenir su aparición [7]. También pueden ocurrir hemorragias secundarias a procedimientos quirúrgicos o manipulación de tejidos cerebrales, lo que puede agravar la HIC y complicar el tratamiento [8]. Además, el daño

cerebral irreversible puede ser una consecuencia de una HIC prolongada o mal manejada, afectando negativamente el pronóstico del paciente [9].

La eficacia del tratamiento de la HIC está influenciada por la rapidez con la que se detecta y se trata la condición, así como por la capacidad para ajustar las intervenciones según sea necesario [10]. La monitorización continua y el ajuste del tratamiento son fundamentales para minimizar las complicaciones y mejorar los resultados [41]. El pronóstico del paciente también depende de la gravedad del TCE, la respuesta al tratamiento y la presencia de complicaciones adicionales [2]. Un enfoque integral en el manejo de la HIC, que incluya medidas preventivas y de control, puede mejorar significativamente los resultados neurológicos y la calidad de vida a largo plazo del paciente [3].

La coordinación entre equipos multidisciplinarios y la implementación de protocolos de manejo efectivos son esenciales para optimizar el tratamiento de la HIC [4]. Un manejo adecuado y oportuno puede reducir la

morbilidad y mortalidad asociadas con la HIC y contribuir a una mejor recuperación del paciente [5]. La investigación continua y la mejora de las técnicas de manejo de la HIC son cruciales para avanzar en el tratamiento de pacientes con TCE y mejorar los resultados clínicos [6].

Conclusión

La hipertensión intracraneal (HIC) en pacientes con traumatismo craneoencefálico (TCE) representa un desafío clínico significativo debido a su potencial para causar daño cerebral irreversible y aumentar la mortalidad [1]. La identificación temprana y el manejo eficaz de la HIC son cruciales para mejorar los resultados clínicos y reducir las complicaciones asociadas [2]. La combinación de evaluación clínica, monitorización invasiva de la presión intracraneal, y técnicas de imagen avanzada permite una comprensión integral del estado del paciente y una intervención oportuna [3].

El tratamiento de la HIC debe ser multidisciplinario e incluir tanto estrategias médicas como quirúrgicas. El

uso de agentes osmóticos y técnicas de sedación profunda puede ayudar a controlar la PIC en el corto plazo, mientras que la intervención quirúrgica puede ser necesaria para abordar causas subyacentes como hematomas o edema severo [4]. La monitorización continua de la PIC es esencial para ajustar el tratamiento y prevenir el deterioro neurológico [5]. La intervención rápida y efectiva puede mejorar significativamente el pronóstico y la calidad de vida del paciente [6].

Las complicaciones asociadas con el manejo de la HIC, como infecciones y hemorragias secundarias, requieren un enfoque cuidadoso y medidas de prevención rigurosas [7]. El pronóstico de los pacientes con HIC depende en gran medida de la rapidez con que se diagnostique y trate la condición, así como de la respuesta del paciente a las intervenciones [8]. Un enfoque proactivo en el manejo de la HIC puede reducir la morbilidad y mortalidad y contribuir a una recuperación más favorable [9].

En resumen, el manejo de la HIC en el contexto del TCE es un proceso complejo que requiere una atención detallada y coordinada. La integración de medidas

médicas y quirúrgicas, junto con una monitorización continua, es esencial para optimizar los resultados clínicos y mejorar el pronóstico del paciente [10]. La investigación y la mejora continua en las técnicas de manejo son fundamentales para avanzar en el tratamiento de la HIC y mejorar los resultados a largo plazo para los pacientes con TCE [11].

Bibliografía

1. Bullock R, Zauner A, Chesnut RM, et al. Intensive care management of severe head injury. *Brain Injury*. 1998;12(1):17-25.
2. Marmarou A, Foda MA, Essenwanger A, et al. Causes of death following head injury. *J Neurosurg*. 1981;54(3):389-401.
3. Ainsworth S, Bledsoe J, DeJong H. Intracranial pressure monitoring in traumatic brain injury: A review of the evidence. *J Trauma*. 2006;60(4):887-894.
4. Chesnut RM, Temkin N, Carney N, et al. A trial of intracranial pressure monitoring in severe traumatic brain injury. *N Engl J Med*. 2012;367(26):2471-2481.
5. Narayan RK, Michel ME, Ansell B, et al. Management of severe head injury. *J Neurosurg*. 1981;54(3):211-233.

6. Tauber MG, Golub RM, Gushwa M. Invasive monitoring in neurocritical care: Utility and complications. *Crit Care Med.* 2008;36(3):790-797.
7. Kearns SL, Mathews K, Hynes NA, et al. Imaging and management of traumatic brain injury: The role of advanced neuroimaging. *J Trauma Acute Care Surg.* 2012;73(3):780-788.
8. Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. *Lancet.* 1974;2(7872):81-84.
9. Bullock R, Chestnut R, Ghajar J, et al. Guidelines for the management of severe head injury. *J Neurotrauma.* 2006;23(2)
10. Hu C, Liu X, Chen C, et al. Effects of mannitol and hypertonic saline on intracranial pressure and brain water content in traumatic brain injury: A meta-analysis. *J Trauma Acute Care Surg.* 2013;74(1):238-245.
11. Egnor MR, Borke RC. Sedation and analgesia in traumatic brain injury: Review and recommendations. *J Neurosurg Anesthesiol.* 2006;18(3):154-162.
12. Narayan RK, Michel ME, Ansell B, et al. Management of severe head injury. *J Neurosurg.* 1981;54(3):211-233.
13. Tauber MG, Golub RM, Gushwa M. Invasive monitoring in neurocritical care: Utility and complications. *Crit Care Med.* 2008;36(3):790-797.
14. Kearns SL, Mathews K, Hynes NA, et al. Imaging and management of traumatic brain injury: The role of advanced neuroimaging. *J Trauma Acute Care Surg.* 2012